醫經細錄

沙喬堂摘錄

歲次甲辰五月廿五日

一九六四年七月四日

沙[illegible]

静轩公名兆楷，为余之四世叔祖，幼即喜劳苦之学医，颇得医之三昧，精内外两科，济世以来，活人无算，尤以不计利为当日乡里所景重，然公之衣钵无传，实为憾事。如今吾乡人民之好医者也。此书为公之手录，内容丰富，书首有咸丰十二年端节沁静轩抄完订字样，字迹亦与书内无异。复查咸丰卒于公元年（一八六一—一八六二年），恐为他人之误书也。

七世孙 沙陆 识
一九六四年七月四日
甲辰五月廿五日

McGILL
UNIVER-
SITY
LIBRARY

咸豐拾叁年端陽河靜軒抄完訂

咸豐拾叁年

醫經綱領

陶葛堂摘録

醫學心悟

李專山醫世

陶葛堂摘録

○天疱解毒 黃連 茯苓 淡竹葉 羚羊 元參 川芎 桔梗 甘葛 銀花 紫菀 赤芍 生姜 ㊞

產前安方 歸芎 白芍 蘇葉二 羌五 殼六 朴 艾七 荊芥八分 甘草五 黃芩 菟絲 川貝 各 引生姜

產後安方 歸三 芎一 桃仁五分 益母 澤蘭 紅花一 查二 炮姜 灸草 赤芍

○產後敗毒 金銀花 連翹 只貝 甘草 桔梗 黃芩 元參 次生地 槐花 赤芍 荊芥 防風 薄荷 大黃 燈心竹葉

佛手散 當歸 川芎 烏梅 灸血餘炭

○下乳湯 因不通行の物 湯內 熟地 生芎 麥芽 山甲 黃芪 通草 七星肘子燉吃

回乳 歸尾 川芎 澤蘭 赤芍 牛夕 益母 前胡 麥芽 炒生地

套子膏○治跌打損傷 乳香 没药各三钱去油 大黄 潮腦各五分 右為細末用蜜調敷

破傷生風有膿為破傷風無膿是乾甲風○用南星一两 蟬蜕五钱 魚鰾二尺土炒 共為末每服三钱老酒送下嚼生葱白三寸

片射金黄散○人中黄 大黄 黄柏 白及 五倍子 白斂 小粉炭 射香一 寒水石 冰片 共為細末陳醋調敷露其頂

代針膏○治痈瘡不用刀針一点即破 瘡大者以筆蘸药画為十字其瘡自開 自于紅肉上画之即潰出膿矣

用良油子三钱 硇砂五钱 生石灰一两 白砒三钱 碱滷二碗 將碱滷熬至一碗入石灰熬一刻令干 以燒酒調

生肌玉紅膏○待瘡已潰後用 白芷 甘草五钱 归身二钱 血竭 輕粉四钱 紫草五钱 白占 麻油二两 浸 火先將草药炸枯

次下血竭 次下白占 化開取下 少候方下極細輕粉 攪勻 不得加减

賽針散○ 巴豆五钱去皮 輕粉五钱 硇砂五钱 白丁香五钱 共為末 猪胆調塗膏紙上貼之

○輕粉 杏仁 茴香 没药各廿文 共為細末唾津調塗 治毒瘡并發

金蟾膏○治阴瘡用活蝦蟆一個 連皮搗爛敷上即愈

秘膏○治陰瘡用干伏姜末調鮮猪胆敷上以紙蓋于上以水潤之 候黑水出為妙 若不知疼痛不治之症

治疮膏。大黄 朴硝 等分为末 麻油调 ○紫金丹 治疔毒 口疮 喉痹 吹之 用苦石油炸焦浮起 取出为末 紫色 方以油调搽之

绿云散。黄柏 青代 黄连 地骨皮 共为末 搽舌上咽津 口疮搽之 ○大头瘟方 用福建烟花 三钱 烧灰 一钟 调服立愈

冻疮方。松香 黄蜡 等分化开 倾入水中 取出捻成条 灯火上烧 流滴疮口上

专贴发背膏。真麻油 清桐油 各半斤 净猪毛 三两 候二油滚 下猪毛熬化 入丹八两成膏

治鼠疮膏药方。沙参 三钱 核桃 公母一对 头发 三钱 杏仁 七个去皮 槐枝 七寸 丹 五[illegible] 油 二两

鸡肾散。治疮不收口。用鸡肾皮 二钱 瓦上焙干 黄公鸡的妙 鹿角灰 三钱 儿茶 钱 飞黄丹 二钱 共为末 搽患处

洗痔漏方。茄根 钱 葱白 二根 艾 二钱 马齿苋 钱 五倍子 钱 [illegible] 各分 川椒 钱 熬水洗

治心漏方。鹿茸 去毛酥炙黄色 附子 炮去皮脐 盐花 水 等分 共为细末 枣肉为丸 桐子大 每服卅丸

痘疮方。用穿山甲 一片 炒黄 加射少许 酒调 三五分 量儿大小服之

四圣珍珠散。治痘疮灰白臭 黑气成疔者 用珍珠 另研为末 豌豆 四十九粒 烧成 头发 灰 以胭脂调成 先用银针挑疔点之

上用黄水瘡方。用官粉丸子入鍾内人乳調勻鍾口覆下内点蕲艾熏黄色搽面上和無痕跡 又方用狗毛[illegible]嘴燒灰 香油調搽即愈

走馬牙疳散。大紅棗一枚去核入肥丸燒存性用半 硼砂三分 赤代三分 黄連三分 冰片一分 為末搽之 又方 枯孔肥丸為三千 赤粉七千為末搽之

接骨草方。黄栀子 連須大葱一把搗爛敷上以布纏住以乾燒酒不時噴之勿令其干即愈

地黄丸。治内痔 地黄一斤 生茯苓半斤為末 螳螂一升焙干 丸焙為末 蜜丸桐子大每服三十丸滚水送下

点楊梅方 白砒一分 猪精肉一分 老肉桂五分 共搗為泥 黄泥包火煅紅取出為末 鵝膽汁調搽

接箭鏃方 巴豆二個去皮 蜣螂一个即屎蜣螂也 共研爛塗上 疼定痒急 接出即愈

治天蛇頭瘡方。红草麻子肉 雄黄 人指甲炙黄研 飛羅面 右四味研為糊塗患處 手以井水潤之 再用綃帛縛之

又方 蜈蚣一条 全蝎一个 瓦上焙加雄黄一分 裝入猪胆内套在指上縛之〇乳痛方 大凡生瘡服此湯甚妙

〇蒲公英 連根葉搗濃汁入好黄酒一鍾冲服 即睡 安穩是其功也

用古嵩霜不拘多少即梳子上髮垢也 多搓成為丸桐子大每服五七丸以御流水送下 令病左

[illegible]肋金丹治乳痛〇 隨患之左右而卧 [illegible]露[illegible]手 倒流[illegible]取須[illegible]丸上流右[illegible]之

出瘡頭方。用牛蒡子一粒水吞可出其頭。治湯泡無毒火燒成瘡山豆根黃芩稀墨馬前子代苦參

金形散治牙痛。蒼术鹽一斤油炸 冰片三厘 為末擦之。貼面部膏藥方貼杖瘡亦妙。鉛粉二兩 麻油四兩

搽血歸四分 髮椎柴一團 除粉外三味入油熬枯去渣下粉再熬黑取下候凝結入乳香沒藥血竭兒茶

赤石脂 龍骨 象牙 象皮炒研以上各五分下入前藥內攪成膏

龍骨丹兩。雄黑牛末一斤煅玉 針砂二錢陰干 雀瓜二錢陰干 胡椒 干姜 共為末白兔馬尿為丸陰干 米少許搽牙上

治脹水腫毒法。用行經婦人騎馬布洗水飲下即解。瓜蔞散。瓜蔞一個為泥 當歸 甘草各五錢 乳香 沒香各一錢 牛蒡二分

又治二蟲兹一種溫服未愈加人參白术黃芪。化管作膿方。胡連一兩 姜炙刺猬皮兩炙黃色 麝香三分 飯為丸

子大每服廿丸服至廿日再服內托長肉閉口收功丸。胡連一兩 川山甲炙五錢 石決明煅四錢 槐花炒 蜜丸每服

三品一条鎗。核凡三錢 雄黃一錢 白砒六分煅 共為末。打傷十三味。陳皮 紫蘇 續斷 桃仁 蘇木 青皮

藕節 當歸 紅花 李仁 赤芍 乳香 沒藥。如氣虛不順加木香 食加山查麦芽 熱加黃芩 加姜

喘加杏仁 傷在胸加桔梗 上部加川芎白芷 下部加牛膝防己 吐加霍香 出汗加桂枝 小便不利加車前木通

五苓散。治小兒疝氣偏墜或受蟀蟻所吹腫痛而並外用蟬蛻熬一水洗之。白术 澤瀉 朱苓 茯苓 肉桂

○三白散治一切腫毒
白皮白蘞
一兩 枯凡五
羊用時入
蛋子心碗
中使沉底
外用帶搽
貼患處像
淡將桑軟
上立消

○鯽魚散
治風瘡白
凡三斗大鯽
魚一斤去尾
歸入凡外
貢泥包
火炭大蝦紅

内傷外感致病十九字

人身之病不離乎内傷外感而内傷外感中只一十九字盡之矣如風寒暑溼燥火外感也喜怒憂思悲恐驚與夫陽虛陰虛傷食内傷也總計之共十九字而千變萬化之病于以出焉此能病即變化而總不離乎十九字一十九字總之一内傷外感而已所謂知其要者一言而終不知其要流散無窮此道中必須提綱挈領也後極放乃方也

外中只一十九字

火字解

解字號

雷

從來火字内經有壯火少火之名後人則曰天火人火君相火龍雷火種種不一而未有溫復虛實二字括之可謂善言火乃人之宗與談而於治火並無定見何以足路辨之稍未確欲予因易其字以解之夫實火者六淫之邪飲食之傷自外而入勢猶賊也虛火者七

如田去泥水
未發汗邪遂
情色怨勞役耗神自內而發，勢移子火熾至則驅之，如消散清涼攻伐等藥皆可按法
下出汗
用子逆則如之，如補氣滋水理脾等藥皆可按法施治。病機一十九字言火者[illegible]，言寒者
蛇傷方
升之二法不明，雜雜切。風寒暑濕燥火有傷，如傷火熾火熾可驅而不可留。而火七情色
蜈蚣一條焙
怨勞役耗神子火也，子可養而不可害。一曰發風寒，擁閉火邪內鬱，宜升發之，如升陽散火湯
斷入黃酒
之類是也。二曰清內熱，極盛宜用寒涼，如黃連解毒湯是也。三曰火氣鬱結，大便不通，法當
一碗益漿
攻之，比釜底抽薪之法，如承氣湯之類是也。四曰制熱氣，拂鬱清之不去，攻之不可，此本
去渣服之
來真水早虧，不能制火，所謂寒之不寒，是無水也，當滋其腎，如地黃湯之類，可用也。
外用蔥芦
蒙搗爛
養子火有四法。一曰達肝經氣結，五鬱相因，當順其性而升之，所謂木鬱則達之，如逍
敷至愈
數是也。二曰滋虛火上炎，必滋其水，所謂壯水之主以鎮陽光，如六味湯之類是也。三曰溫
出汗即愈
[illegible]
勞役神疲，元氣受傷，陰火乘其土位，經曰勞者溫之，又曰甘溫能除大熱，如補中益氣湯
此筆能治
是也。四曰引腎氣虛寒，逼其無根失守之火浮游于上，當以辛熱雜於壯水藥中導
風蛇毒瘡
之下行，所謂導龍入海，引火歸元，如八味湯之類是也。
[illegible]

桔梗　川芎
甘草　生姜
羌活　獨活
防風　荊芥
姜棗煎

○治陰癬陰風方用白藥數分濟搦擦之一方用燒酒泡白礬擦立好

○治坐板瘡方用西瓜皮煆乾既灰為末圍搽

寒熱虛實表裏陰陽辨　訣曰三病情賦

病有搃要寒熱虛實表裏陰陽八字而已病情既不外此則辨症之法亦不出此一病之寒熱全在口渴與不渴渴而消水與不消水飲食喜熱與喜冷煩燥與厥逆溺之長短赤白便之溏結脈之遲數以分之假如口渴而能消水喜冷飲食煩燥溺短赤便結脈數此熱也假如口不渴或假渴而不消水喜飲熱湯手足厥冷溺清長便溏脈遲此寒也一病之虛實全在有汗與無汗胸腹脹痛與否脹之減與不減痛之拒按與喜按病之新久稟之厚薄脈之虛實以分之假如病中無汗腹脹不減痛而拒按病新人稟厚脈實有力此實也假如病中多汗腹脹時減復如故痛而喜按病久稟弱脈虛無力此虛也一病之表裏全在發熱與潮熱惡寒與惡熱頭痛與腹痛鼻塞與口燥舌胎之有無與脈之浮沉以分之假如發熱惡寒頭痛鼻塞舌上無胎脈息浮此表也假如潮熱惡熱腹痛口燥舌胎黃黑脈息沉此裏也至於病之陰陽統上六字而言所包者廣熱者為陽實者為陽在表者為陽寒者為陰虛者為陰在裏者為陰寒邪客表陽中之陰熱邪入裏陰中之陽寒邪入裏陰中之陰熱邪達表陽中之陽而真陰真陽……

治汗斑方
陀僧半斤
硫黃半兩
澡豬半川
椒七个共為
末姜汁調擦
患處

治脈痔嘴
疔方用蚯
蚓焙黃為
末麻油調擦
患處

〇治雞爪風
方干姜兩相
破川烏以上各

則又不同假如脈數無力虛火時炎口燥唇焦內熱便結氣逆上衝此真陰不足假如脈大無力四肢倦怠唇淡口和肌冷便溏飲食不化真陽不足也虛實表裡陰陽之別括不外此然病中有熱證而喜熱飲者同氣相求也有寒證而喜冷飲卻不能飲者假渴之象也有熱症大便泄瀉者挾熱下痢也有寒症而大便反鞕者名曰陰結也有熱症手足厥冷者所謂熱深厥亦深熱微厥亦微是也有寒症而反煩躁欲坐臥泥水之中者名曰陰躁也有汗而為實症者熱邪傳裡也有無汗而為虛症者津液不足也有惡寒而為裡症者直中於寒也有惡熱口渴而為表症者溫熱之病自裡達表也此乃陰陽變化之理為治病之權衡也

論汗法

汗者散也經云邪在皮毛者汗而發之是也又云體若燔炭汗出而散是也然有當汗不汗誤人者有不當汗而汗誤人者有當汗不可汗而妄汗之誤人者有當汗不可汗而又不可以不汗汗之不得其道以誤人者有當汗而汗之不中其經不辨其藥知

主本煨大左
本一文與華
目無服之
灸鴉爪風方
九婦人目間
得此手足之掌
傳摹來如
鴉爪狀可
于左右膝
脊旁有小
窩若兩穴
俗名鬼眼
灸大炎三壯
即愈
狐臭方用

發而不知欲，以誤人者是否可以不審也。柝則風寒而客於人，以頭痛發熱而惡寒，
鼻塞聲重而體痛，皮毛受病，法當汗之。若失時不汗，或汗不如法，以致
湊理閉塞，榮衛不通，病邪深入，流傳經絡者是也。宜汗不汗之過也。六日頭
痛發熱與傷寒同，而其人倦怠無力，鼻不塞，聲不重，脈來虛弱，此內傷元氣。
此言症又是勞役色慾，積內熱，脯熱，脈細而無力者；又是傷食病，胸膈滿
悶，吞酸噯腐，日晡潮熱，氣口脈緊者；又是寒痰厥逆、濕淫腳氣、內癰外癰、
瘀血凝積，以及風濕、濕溫、中暑、自汗諸症，皆有寒熱，與外感風寒似同而實異。
若誤汗之，變症百出矣。所謂不當汗而汗者，此也。若夫症在外感，應汗之例，而其人
臍之左右上下或有動氣，則不可以汗。經云：動氣在右，不可發汗，汗之則衄而渴，心
煩，飲水即吐。動氣在左，不可發汗，汗之則頭眩，汗不止，筋惕肉瞤。動氣在上，不可
發汗，汗之則氣上衝，正在心中。動氣在下，不可發汗，汗之則無汗，心大煩，骨節疼

枯凡蛤粉
樟腦各五
分為末搽
之
○治龜頭爛
痛方輕粉
乳香沒藥
兒茶為末搽
油調塗
○妒精瘡方
治龜頭瘡
蝕有膿用
冰片象牙
珍珠桂丹
各為末用
米泔水洗

目運昏入胃吐舌不得前又脈沉咽燥病已入裡汗之則津液越出大便難而譫
語又少陰但厥無汗而強發之則動血未知從何道出或從耳目或從口鼻出
者此為下厥上竭為難治又少陰中寒不可發汗之則厥逆倦臥不能自溫也又寸
脈弱者不可發汗之則亡陽尺脈弱者不可發汗之則亡陰也又諸亡血家不可汗
衄則直視額上陷淋家不可發汗之則便血瘡家不可汗之則痓又傷寒病在少
陽不可汗之則譫妄又壞病虛人及女人經水適來者皆不可汗若汗之變症多出
矣所謂有汗不可汗而妄汗誤人者此也夫病不可汗而又不可以不汗則將[illegible]
乎是有述焉傷寒賦之動氣理中去白朮是即於理中湯去白朮而加汗藥保元
氣而除病氣也又表邪又裡而表未解者仲景有麻黃石膏之例有葛根黃
連黃芩之例是清涼解表法也又太陽症脈沉細少陰症反發熱者是麻黃

患處毒濕
將藥搽上
干則以唾津
塗之
蚰蜒入耳方
用猫尿灌入
耳中即出
取猫尿法
用菜搽于
鼻上即出
○鱉一段搬治
汁乳脫肛
用鱉頭燒
灰存性搽
油調敷即

附子細辛之例，是溫中解表法。又少陽中風用柴胡湯加桂枝，是和解中兼表法。又陽虛者東垣用補中湯加表藥，陰虛者丹溪用芎歸湯加表藥，其法精且密矣。總而言之，凡一切陽虛者皆宜補中發汗，一切陰虛者皆宜養陰發汗，挾熱者皆宜清涼發汗，挾寒者皆宜溫經發汗，傷食者則宜消導發汗。感重而體實者汗之宜重，麻黃湯；感輕而體虛者汗之宜輕，香蘇散。亨嘗治傷寒初起，專用香蘇散加荊防川芎、秦艽、葛、荊，一劑奇效。凡陰虛陽虛挾食挾熱挾寒而為病者，即按前法治之。倘如病在太陽證發散陽明，已陽之後病在太陽之經而和解少陽，則引賊入門矣。倘如病在一經而專治一經，已遺一經；病在三經而偏治一經，亦遺二經矣。倘如病在一經而兼治二經，或兼治三經，則邪過經矣。況太陽無汗麻黃為主，太陽有汗桂枝為主，葛根專主陽明，柴胡專主少陽，皆的當不易之良法。至於九味羌活，乃兩感熱證，三陽三陰并治之法，初非為太陽一經設。又柴葛解肌湯乃治春溫夏熱之病，自裏達表，其證不惡寒而發熱口渴者；若新感風寒惡寒而口不渴者，非所宜也。又如傷風自汗用桂枝湯，傷暑自汗則不可

退入

○阴户生疮
用蛇床煎盆
汤洗二三次
再以杏仁烧
存性油
调搽入阴窍

○产妇生肠突
出方用枯柳
叶煎熏洗
外以冷水
喷其面则
旋入如牛马
肠出用鞋底

用麻黄用之热邪愈盛而病必增如於暑证则需发散复伤津液名曰重暍多
致不救古人设为白术防风例以治风设益元散香薷饮以治暑俾不犯三阳禁小忌者
更有以火人为发汗退热之法而不知敛汗退热之法汗不出则散之汗出多则敛之敛
之者非桑皮敛表之谓其谓致病之因出汗有由治得其宜汗自敛耳譬如风伤卫自
汗出者以桂枝汤和营卫祛风邪而汗自止若热邪传里令人汗出者乃热气蒸之蒸一
如釜中吹煖水气旁流非虚也急用白虎汤清之若邪已结聚不大便者则用承气汤
下之热气退而汗自收矣此与伤暑自汗略同但暑伤气为虚邪只有清补并行
一法寒伤形为实邪则清热之法外更有攻下止汗之法此后有发散太过遂至汗
阳身瞤动欲擗地者宜用真武汤此救逆之良药与中寒冷汗自出者同类并称又与
五症汗出大相径庭矣其他少阳症头汗或盗汗者小柴胡汤水气之症头汗出者小
半夏加茯苓汤主之虚人自汗盗汗等症则归脾补中八珍十全按法而用无曲是寻

擘其己

○血風瘡方
用舊鞋底燒灰存性研末香油調敷

○治遠年瘡瘡方
用九里明礬拘多少以核根煎湯洗為末敷上即愈

人咬破傷方
用龜板或鱉甲

擇之盡其妙而後即無所謂汗之無其任必得其藥之為發需為斂者此所謂百病起於風寒風寒無先客表汗之其法於病不除汗法之一差夭枉隨之夫汗汗豈易言哉

論和法

傷寒在表者可汗在裏者可下其在半表半裏者惟有和之一法焉仲景用小柴胡湯加減是已然易言和不和誤人者有不當和而和以誤人者是當和而和而不知表之寒熱虛實臟腑之殊寒濕邪氣之易解以誤人者是不可不知也夫病當耳聾脅痛寒熱往來之際應用柴胡湯和解而反以麻黃桂枝發表誤矣或發表豈猶攻裡則亦誤矣又或因其胸滿脅痛而吐之則亦誤矣蓋病在少陽有三禁汗吐下是也且非惟汗吐下有所當禁即今之三法而妄用他藥均為無益而反有害者又有言少陽膽為清淨之府無出入之路只有和解一法柴胡一方最為切當何其所見之陋而不知此法精微之蘊此乎且所謂當和而和者亦非不當和而和者如病邪在表未入少陽誤用柴胡謂之引賊入門輕則為瘧重則傳入心胞漸變神昏不語之

甲寅六月存性
外末方用調
搽塗之
○漆瘡浮腫
方用泡湯洗
用芒硝泡湯
○洗之用擲
賁漆之神效
○大麻風癬方
苦楝皮 小麥
[illegible]為奇
[illegible]鹽滷重
洗不兩遍
近其效如神

瘧六日邪已入裡煩渴譫語諸症叢集而醫者但以柴胡湯治之則病不解至於何傳
使內傷飲食氣虛血虛瘀腫痰血諸症俱今寒熱往來似瘧非瘧皆非柴胡湯
一所謂表者亦不辨明症候切莫用藥而傷其平穩之法巧為藏拙誤其正治
所謂不當和而和者此也能之三當和而和而不知寒熱之多寡者何也夫偏寒之
邪在表為寒在裡為熱在半表半裡則為寒熱交界之所能只偏於表
者則寒多偏於裡者則熱多而用藥須與之相稱庶陰陽和平而邪氣頓解否
則寒多而熱少熱多而寒少其患是既不平病益增劇此所不和而和之而
皆寒熱多寡之宜者也能不當和而和而不知察質之虛實者何也夫實邪在
邪在表猶如純用大門豈敢反送於虛者而之虛宜必究其重奧也虛乃要
除而進並前小柴胡用人參者所以補其正氣使正氣旺則邪氣不容自然

○往肩又喉方用人指甲燒存性為末吹入又用硼砂一塊嚼之甚者自下

薏苡散治肺癰肺癰咳嗽胸中隱作痛用苡仁方都人参黄芪各一當归白芍

得汗而解其邪由表入復由表出也六日是表邪失汗腠理致寒熱往來
由是而傳入少陽半表半裏之界國法不問本氣之虛實是不用人參而和解自愈者是
為病是虛實法當變通不可誤以柴胡是當和而和而不知臟腑之燥濕者何
以少陽病在少陽而不渴大便如常是津液未傷清潤之藥不宜太過而半
夏生姜皆可用若口大渴大便閉結是邪已傷陰津液必耗少則半燥
燥之藥可除而花粉瓜蔞是必用矣所謂臟腑有不同者此也是當和而
和而不知邪之盛衰者何也如邪在少陽而太陽之頭症未罷是少陽兼表
邪也小柴胡中須加表藥仲景是柴胡加桂枝之例矣又如邪在少陽而兼
裡症則便閉譫語燥渴之症生小柴胡中須兼裡藥仲景是柴胡加芒硝
之例矣又三陽合病閉目則汗面垢譫語遺尿者用白虎湯和解之是兼三陽同病
也連胃腑而半涼之藥內清本腑外徹肌膚令三經之邪一同解散是

芎[illegible]味子
半夏乃芩
小生姜
並服
桂枝湯治
肺癰咳嗽吐
[illegible]血咽干
而渴大小便
不利胃中
隱隱徹痛
之症大凡嘛
嗽氣鞕胸滿
時吐腥血久
之於經來

專以清劑爲和矣所謂邪之兼併者此由是推之是清而和者有溫而和者有消而和者有補而和者有燥而和者有潤而和者有兼表而和者有兼攻而和者和之義則一而和之法變化無窮焉知斯意者則溫熱之治瘟疫之方時行痎瘧皆從此推廣之不難應手而愈矣

論下法

下者攻也攻其邪也病在表則汗之在半表半裏則和之病在裏則下之而已然有當下不下誤人者有不當下而下誤人者有當下不可下而妄下之誤人者有當下不可下而又不可以不下下之不得其法以誤人者有當下而下之不知淺深不分便溺與蓄血不論湯丸以誤人者又雜症不別寒熱積滯痰水蟲血癰膿以誤人者是不可不察也何謂當下不下仲景云少陰病得之二三日口燥咽乾急下之少陰病六七日腹滿不大便者急下之下利脈滑數不欲食按之心下鞕者有宿食也急下之陽明病譫語

衛去难治
若嘔膈不
止者不可
治其嘔自
止者可食
五面者白
而反赤者
此不能生
也不可治
用桂枝更
毋暮毋仁藥
仁當但只一
民附

不能食胃中有燥屎也可下之陽明病發熱汗多者急下之少陰病下利清水色純
青心下必痛口乾燥者急下之傷寒六七日目中不了了睛不和無表症大便難者急下
之此皆當下之例若失時不下則津液枯竭身如槁木勢難挽回矣然又且不當下而下
者何也如傷寒表症未罷病在陽也下之則成結胸病邪雖已入裏而散漫於三陰經
絡之間者未結實若遽下之亦成痞氣況有陰結之症大便反鞕得溫則行如開冰解凍、
之象又雜症中有高年血燥不行者有新產血枯不行者有病後亡津液者有亡血者
有日久不更衣腹無所苦别無他症者若誤下之變症蜂起矣所謂不當下而下也然又
且當下不可下者何也病有邪傳裏已成可下之症而其人臍之上下左右或有動氣則
不可以下經云動氣在右不可下下之則津液内竭咽燥鼻乾頭眩心悸也動氣在左不
可下下之則腹内拘急食不下動氣更劇雖有身熱卧則欲踡動氣在上不可下下之
則掌握煩熱身浮汗泄欲得水自灌動氣在下不可下下之則腹滿頭眩食則清谷
心下痞也又咽中閉塞者不可下下之則下輕上重水漿不入踡卧身疼下痢日數行又脉濡

當歸 甘草
白芍 參
生姜 煎服
○黃連瀉湯
心火上炎生瘡
或舌上腫燥裂
舌尖出血或
舌破左手
寸脉洪數
黃連 生地 當
歸 芍藥 多
冬 山梔 薄
荷 犀角 甘
草 燈心
合煎服

弱者不可下脉浮按之無力者不可下脉遲者不可下喘而胸滿者不可下吐欲嘔者不可下病人陽氣素微不可下之下之則呃病人平素胃弱不能食者不可下病中能食胃無燥屎也不可下小便清者不可下病人腹滿時減復如故者不可下若誤下變症為出矣有謂者下不可下而妄下誤人者此也能知者下不可下而又不得不下者何也夫以虛羸弱之人虛細之脉一旦而患邪禦之是為正虛邪盛最難措手者人且法為有潤法也有導法也有先和之法為有先補後攻有先攻後補之法也有攻補並行之法也不可不講如三黃解毒清之也麻仁杏仁汁潤之也蜜煎猪膽汁導之也涼膈散大柴胡小和之也又有脉虛體弱不能勝任者則先補之而後攻之或暫攻之而隨補之或以人參湯送下三黃枳朮丸又或以人參瓜蔞枳實攻補並行而不相悖蓋峻劑一投即以參朮歸芍維持調護於其中俾邪氣潛消而正氣安固不愧為王者之師矣又有雜症中大便不通其用藥之法可相參者如老人久病新產婦人每多大便閉結之症丹溪

瀉青湯治
肝火盛不
氣实或脇
痛氣從左
边起左或
目紅腫左
関脈洪數
當歸芎歸
龍膽草連
羌山梔子
防風大黄草
某小柴湯服
芍藥湯治
甲大或消化
先食或胃燥

用四物湯加升麻及前湯潤藥治老人血枯以致血固不能便者往々有驗 此皆要曲通
亡津若果人虛難傳經熱邪不得傷用寧可猛劑一往攻擊真元致成洞瀉雖曰天
命豈非人事哉所謂下得其法者先以脈之上下而不知淺深不分便溺與蓄血不
論湯丸以誤人者何也如仲景大承氣湯必痞滿燥實堅全者乃可用之如但痞滿而未
燥實仲景只用瀉心湯痞滿兼燥而未實者仲景只用小承氣除去芒硝恐傷下焦陰
血也燥實在下而痞滿輕者仲景只用調胃承氣湯除去枳朴恐傷上焦陽氣又有太
陽傷風症誤下而傳太陰以致腹痛者則用桂枝湯加芍藥大實痛者桂枝湯加大黃
是解表之中兼攻裡也又有邪從少陽來寒熱未除則用大柴胡是和解之中兼攻裡也
又結胸症項背強從胸至腹滿而痛手不可近者仲景用大陷胸湯丸若不當不
痛者只用小陷胸湯若寒實結胸用三白散熱藥攻之又水結胸頭出汗者用小半夏加茯
苓湯水停脇下痛不可忍則用十棗湯又結胸陰陽二症服藥罔效活人俱用枳實理中丸
手而愈又河間三書云熱蓄神昏厥至脈反滯澁有微細欲絕之象世俗未明造化之

虛煩或痞者
痞煩渴右關
脉數者宜養
連梔子連翹
膀胱右尺又
半甘草三分
小便澀脈
○平安散治食
寒熱大脹滿
治馬鞭驟降
脹半吞刺腹
脹等症宜
粉珠砂銀
蛛雄黃水
痞積丸射
消積散加鹽等分

投以溫藥則不可救或者妄行攻下致殘陰暴絕勢大可危不下亦危宜用涼膈散合解
毒湯養陰退陽積熱藉以宣散則心胸和暢而脉證漸減仍生此證用藥清涼之後第以又與大陷
痞未經口渴小便短澀大便如常此濕濁不通之症治用五苓散大陷胸本熱結膀胱其人如狂
小腹硬痛者則用桃仁承氣湯或用四生地四物湯加清炒大黃各半下之丸為穩當主血瘀濁
痞大便如常並無痞症小便不利蓄血症小便自利大便色黑此係溲澀蓄血之所由血與結膀
胱痛勢最急則用抵當湯稍輕者抵當丸結胸寬之症甚者則用大陷胸湯稍輕大陷胸丸其
他滌蕩腸胃推陳致新之法則皆用湯宜大黃丸用下藥攻邪並用刻勝丸散熱濕於內
陽濟滌除之蕩清淨耳此湯丸之別也惟又有積症中有寒熱積滞痰水蟲血瘀膿以誤其
何當見腹侍痞腹痛便閉拒按者因於冷食用見睍丸因於熱食用三黃枳實丸若冷熱互
結則以二丸酌其所食之多寡而互用之庶乎所致又宜熱者痰涎痰丸水腫實症神祐丸蟲積
並紅丸血積宜桃仁承氣丸腸癰牡丹皮散隨症立方各有攸宜此積症改下之法亦並無痛家
不論有法每祝下藥為畏以遂病者亦祝下藥為砒霜鴆毒熱症要危袖手旁觀要之天

共六分極細末用
○此雌雄刺方
此瘡多因竹木簽傷手足仍有二種雄正生一个雌生者血七个瘡内皆有孔係外也有刺在足也用桑木燒灰入鞋靴干用者漏以米湯洗之頓換立好
[illegible]雨瘡方

以上共六方悉存

論消法

消者去其壅也臟腑筋絡肌肉之間究本無此物而忽有之必為消散乃得其平經云堅者削之是已然有當消不消誤人者有不當消而消誤人者有當消而消之不得其法以誤人者有消之而不明部分以誤人者有消之而不辨夫積聚之原有氣血積食停痰蓄水癰膿蟲蠱勞瘵與夫痃癖癥瘕七疝胞痺腸覃石瘕以及前後二陰諸疾以誤人者是不可不審究夫人起居有節飲食有節和平恬淡氣血周流谷神充暢病起從來惟夫一有不慎則六淫外侵七情內動飲食停滯邪日留止則諸症生焉法當及時消之俾其速散氣行則愈耳倘遷延日久積氣盤踞堅牢日漸強大有欲拔不能之勢雖有智者亦難為力此當消不消之過也然亦有不當消而消者何如假如氣虛中滿名之曰鼓腹皮膨急中空無物取其形如鼓之狀而因以名之此為敗症必須填實

瘰係肝經濕熱所致外腎囊上起塊子作痒甚則滴水濕甚者宜服豬苓滑石紫蘇甘草湯服萆木通車前赤苓大黃水煎空心服外以鯽魚散搽之坎流麻根瘡方此瘡多生

瘡手可消与盤疵之有出為血肉突而有物者大相逕庭又如脾虚水脹土氣不能制水也非補土不可真陽大虧火衰不能生土者非溫煖命門不可又有脾虚食不消者氣虚不能運化而生痰者腎虚水泛為痰者血枯而經水斷絕者皆非消導所可行也妄用之誤人多矣可謂不當消而消者此也又當消而消之不得其法者何也夫積聚癥瘕之症其初中末之三法焉當其邪氣初客所積未堅則先消之而後和之及其所積日久氣鬱漸深濕熱相生塊因漸大法從中治當祛濕熱之邪削之軟之以底于平但邪氣久客正氣必虚須以補瀉迭相為用如薛立齋用歸脾湯送下蘆薈丸亦有用五味異功散佐以和中丸皆攻補並行中治之道也若夫塊消及半便從末治不使攻擊但補其氣調其血導達其經脈俾榮衛流通而塊自消矣凡攻病之藥皆損氣血不可過也此消之之法也又有消之而不明部分者何也脾肺腎分佈五方胃大腸小腸膀胱三焦膽与膻中皆附麗有常所而皮毛肌肉佐使驅有方使不得移病氣甚之不盡誅伐無過矣此為門第一義也而於消法為尤要不明乎此而勇於攻消病未消而元氣已消其害可勝言哉況乎積聚之原有氣血食積停痰

手足後根下
赤癩內有肉
縷縷好麻
根故名之
足太陽經多
血少氣盛在
下最難瘥用
杜粉霜加学
麻根床下
瘙藍洗去其
附染能內具
氣血海
肥秘瘥方此
是太陽同地
以移黃膿頭
所用烟脂入

當由癩膿虫蠱勞瘵与夫疰癖癥瘕七疝胞痺腸覃石瘕以及前後二陰諸疾皆之
不同若不明辨為害匪輕今因約略而指數之夫積者成於五藏推之不移者也聚者成於
六腑推之則移者也其氣不散者氣也痛且無定處而不散者血也得食則痛噯腐吞酸
者食積也腹且塊而硬者痰也先足腫後及腹者水也先腹滿後及四肢者脹也痛引兩
脇咳嗽而吐涎者停飲也咳而胸痛吐膿腥臭者肺癰也當胃而痛嘔而吐膿者胃脘癰
也當臍而痛小便如淋轉側作水聲者腸癰也憎寒壯熱飲食如常身且痛偏著一處者外癰
也病人嗜食甘甜或異物飢時則痛唇之上下有白斑點者虫也虫有九惟蛇為
鱉則血之所成也胡以知蛇鱉也腹中如有物動而痛不可忍吐血故也又嶺南之地以蠱害人施於飲
食他方之虫多因近池飲冷陰受蛇虺之毒也病人咳嗽痰紅抑抑不樂畏見人喉痛咳
剌者勞瘵生虫也疰如弓弦筋痛也癖則隱癖附骨之痛也癥則且塊可征積之類也瘕
者或有或無痞氣之類也少腹如湯沃小便澀濇者胞痺也痛引睾丸疝也女人經水自月
而腹塊漸大如懷子者腸覃也經水不行而腹塊漸大并非妊者石瘕也有妊無妊可於

雄精枯礬九分
細末油調搽
○千日瘡方俗
名猴子用鴉
膽汁搽之或
以艾灸初起
一个餘俱自落
此生千日自落
○一名青瘡
○齒踞瘡方
此生齒齦上
形如鴉足踞
大一二寸不痛
情觸之則痛
毛心乃是陽
明之毒用莞

云消毒辨云凶五行溼熱下陸則為陰菌陰蝕陰挺下脫陰蓋腫爛之類而出火內燃庚金則為痔漏為懸癰為臟毒種種見症不一而要務在明辨症名擬法而治之也

論吐法

吐者治痰也胸次之間咽喉之地或有痰食癰膿法當從之經曰其高者因而越之是也然有當吐不[illegible]傷人也當吐不可吐而又不可以不吐之不得其法以誤人者是不可辨也即如纏喉鎖喉諸症皆風痰鬱火壅塞其間不急吐之則臍閉難忍矣又或停食胃隔清化不及食由轉輸脹滿疼痛者必須吐之否則胃高滿悶變症莫測矣又或停痰蓄飲阻塞清道日久生變或防碍飲食或頭眩心悸或吞酸噯腐手足麻痺種種不齊宜用吐法導去其痰諸症如失又有胃脘癰嘔吐膿血經云嘔家有膿不須治嘔膿盡自愈凡此皆當吐而吐者也然亦有不當吐而吐者何也如少陽中風胸滿而煩此邪氣而非有物不可吐吐則驚悸又少陰始得之手足厥冷飲食入口即吐此膈上有寒飲不可吐也病在太陽不可吐吐之則不能食反生內煩雖曰吐中有散然邪不除已為小逆也此不當吐而吐者也然亦有當吐不可吐者何也蓋凡病用吐必

察其病之虚实，因人而吐，先察其人之性情，不可误也。夫病在上焦可吐之症，而其人病势危笃，或老弱气衰者，或体质素虚，脉息微弱者，妇人新产者，自吐不止者，诸亡血者，有动气者，四肢厥冷，冷汗自出者，皆不可吐，吐之则为逆候。皆因其虚而禁吐也。夫病久之人，宿积已深，不可吐，吐法心火自降，相火必强，设犯房劳，转生虚症，反难救药，更须戒怒凝神调息，静养越三旬而出，方为合法。若其人性气刚暴，好怒喜淫，不守禁忌，将何以恃以无恐。生变，因性情虚燥，不吐出，所谓吐不可吐者此也。有不可吐而又不可不吐者，何以？病人脉滑大，胸膈停痰，胃脘积食，非吐不除，食用瓜蒂散与橘红淡盐汤，痰以二陈汤，用指探喉中而出之。体质极虚者，或以桔梗煎汤代之，均为稳当，而尤更有法，吾尝治寒痰闭塞厥逆者，亦用半夏、橘红各八钱，浓煎半杯，和姜汁成一杯，频频灌之，痰随药出，则拭之，随灌随吐，随吐随灌，少顷痰开药下，其人即醒，如此者甚众。又尝治风痰，邪中脏将脱之症，其人口噤痰鸣，如常锯声，溲便自遗者，更难治，惟吐而稀涎皂角等物，既不可用，亦不暇用，因以大剂参附姜夏浓煎灌之，若痰随出则拭之，随灌随吐，随吐随灌，久之药力下咽，胸膈流通，参附大进，立至苏醒，其人渐人倦者，内甲上起一月之间，参药救治，遂至平复，如此者众。又尝治风痰热闭之症，以牛黄丸灌如前法，头症仍攻之

花益阳行绕系其二，根下二寸自落如生，龈下是手阳大肠经，用药当本经泄毒亦开擘为好。○最指方出曰：靴鞋或踢蹬，压甲内手肉甲，时时流水痛不可忍，肤医悮把指甲开，药若不效须令

生肌散

得大者以蘇合丸灌如前法風痰不語者以解語丹灌如前法中暑不醒者以消丸灌如前法中惡不省者以菖蒲橘半姜汁灌如前法魘夢不醒者以蓮鬚葱白煎酒灌如前法自縊不醒者以肉桂三錢煎水灌如前法喉閉喉風以杜牛膝搗汁雄黃丸等灌如前法俱獲全安如此者不衆更是牙關緊急閉塞不通者以搐鼻散吹鼻取嚏嚏出牙開或痰或食隨吐而出其人遂甦如此者尤衆是也因病用藥隨藥取吐不吐之吐其意更深此皆古人之成法而予稍爲變通者也昔仲景治胸痛不能食按之反有涎唾下利日數十行吐之利則止是以吐痰止利也丹溪治妊婦轉脬小便不通用補中益氣湯隨服而探吐之往々有驗是以吐法通小便也華佗以醋蒜吐蛇河間以狗油雄黃同瓜蒂以吐蟲而通膈丹溪又以韭汁去瘀血以治前症由此觀之症在危疑之際古人恒以涌劑盡其神化莫測之用況於顯而易見者乎則甚矣吐法之宜講也近世醫者每將此法置之高閣亦以汗下之外并無吐法以致病中常有自吐自汗而爲順症者見者驚聞者駭醫家亦不論虛實而亟々止之反成壞病害人者多矣

論清法

清者清其熱也臟腑有熱則清之經云熱者寒之是也然有當清不清誤人者有不當清而清誤人者有當清而清不分內傷外感以誤人者有當清而清之不量其人不量其症以誤人者是不可不察也夫六淫之邪除中寒之濕外皆不免於病熱之氣甚或見於口舌唇齒之間或見於口渴須溺之際灼知其熱而

○蛇窠瘡方

此瘡因衣服被蛇遊過或飲食內受治蛇毒宜以松針刺血用[illegible]油調[illegible]搽

梳乙藥方

石葉益柯子橘皮去滓棗子桃肉白丸白丸多子壺橘柳葉右爲末用猪苿二十大碗

[illegible]汁灌內封固十餘日方用

○梳頭油妙方。排草 白芷 甘松三钱 丁香一钱 紫草二钱
白冠钱 三奈钱 木香钱 檀香钱 官桂钱 麝三分
麻合油钱 玫瑰油四钱 獨活钱 其菜油四斤浸
七日炉内重湯煮一炷香，時取下埋三日方用

○治涿積鼻妙方。桂枝 硫黄 陀僧 潮脑 柏油共
搗塗之

○治破傷風方。臭蟲 川烏雄雌一对用 防風 南星 狼毒各二钱
先将臭蟲炒熱起，次下川烏炒烈取出，再入南星 然入防
風 狼毒炒黄色為末，每服三钱 黄酒下 大汗出為度 炒華
时以白炒熱鍋内炒好去砂

○五毒四退膏治心痛 水泄 痢疾 下寒 肚冷 食水積氣 貼肚臍 ○
咳嗽 癆疾 貼肺俞穴 筋骨痛 小兒痞氣 貼患處 ○蜈蚣
全蝎 班毛 蝸牛 蛇退 蟬退 鳳退 龍骨各一两 陈醋三斤
熬出火毒透得為度

○陰陽散治赤口瘡此心脾二經熱 黄連
二钱 干姜钱 共炒研末 用地鸡螂搗冰

○珠兒散治白口瘡一名鵞口瘡 此心肝
經熱 珠炒二钱 白凡钱 共研末 先用鵞
涎洗之 後敷此藥 再服洗心散 归尾
生地 滑石 黄連 木通 薄荷 桔梗
甘草 灯心引 水煎

○瞖瘡入眼方 取善魚血 用牙器磨鴨
毛刷上一日七次 如無善魚血 即金疮膠
脂点上亦妙

○瘧疾瘡 好樹上寄子 研為末 標米 左衝 趁熱

○灸陰寒方 用祁艾灸四圍五穴 各三壯
姜汁冲燒酒

空一寸
臍
左一寸 右一寸穴 下一寸穴

灸大便下血方用和艾灸脊中对脐一穴灸五壮
服药用椿白皮 茯苓 橘皮 细辛 桑 人参
桑白皮姜盐服

○灸小肠疝气方用和艾灸大敦穴在足之大拇
指离甲一韭叶许灸三壮

◎五淋散 淋症係肺气不足膀胱有热致
小便不通 淋如豆汁或如砂或膏淋二血皆
治赤茯苓六钱 生地 泽泻 条芩各二钱 当归 甘草
木通各五钱 赤芍 滑石 车前子 山栀各钱 水煎

○白龙汤治男子失精女子梦交盗汗 治自汗
龙骨 牡蛎 桂枝 炙甘草各三钱 大枣二枚 水煎服

○治阴寒方 干姜 胡椒 黄丹 飞罗面各二钱共为
主搽和捏一团放置马口汗出为度之即愈 大葱亦妙

○葱熨法 用大葱阴上根阳八根线结住刀齐两头去
二寸内黑部树末放脐上周围以面围上用烧
熨斗熨之

○如圣散 治一切难疮恶毒点之 人言煅六分 好片 煅两 乳
白矾 治药各五分 蛇含石一个 煅醋淬 胆矾 血竭 难得 加芦甘
石燕 花蕊石研末 黄柏 调涂上 青药贴之 将败肉换
去腐上生肌散

○治面部涂疮方 硫黄子 杏仁去皮尖 各一钱 轻粉七 捣烂 涂调涂

○治裹外臁疮脚疮 生桐油 煮蜡 铜青各 □ 蛋霜
搅成膏贴之 再用花椒 紫苑 丁香 煎水洗净贴 兼禁忌发物

○狗宝丸 治一切疔毒恶疮 狗宝八分 蟾酥三钱 冰片 麝香 好
治为丸桐子大 每服三丸 生葱三寸同药嚼烂 滚送下

◎二 槐金 治疔毒 蜈蚣三条 酒浸焙 雄黄 蟾酥 各三分 射香
白矾各五分 明雄 金钱 焙三钱 脱花三分 右为末 好酒调热服 发汗

○千金托里散 治痈疽肿毒 发汗为妙 白芍 白芷 贝母 防风
甘草节 连翘 干葛 归尾 蜈蚣 酒浸焙 黄 金银花
荆芥 川山甲 炒 各等分 右除蜈蚣后入上数味好酒煎半盏
八分 倾出入蜈蚣末 再煎再入蜈蚣末 如已成形加大黄四
分 调服 有脓加桂更二分 调服 二药后脓出自大便出泻二三
次 以冷茶粥止之

手太陰肺辛金之臓脉居右寸 其実則脉実上也 気粗鼻塞 瀉当辛涼 虚則脉虚少気不足息 但宜補須斂 虚橘甘下痰気之神方 姜陳去気嗽之聖薬 七情鬱結因而喘 沉香烏薬参檳 胸痞喘急鬱而痛 半夏瓜姜桔梗 鼻塞不通 通九荊穂防风加蒼術 鼻淵不止 末礼脳蒼芷辛夷百花 却去仁痰 二母偏除夜嗽 芩連丹茯防杏又桃仁 火而清肺臓 防杏心灯芽 利久嗽以出喉音 咽痛因痰飲 当夏桔朴 咽喉痛 痔痛出

虚者参少利 邪実嗽 救勉兜鈴蝉蛻杏仁陳実 吐霜少入 起症咽喉难 蘇荊芥桔防风参半甘草清 清痘轻 粉硫黄去鼻痔 白礬通 白礬霜性怯重実入豆豉 偏治喘喘 石草霜宗味难轻和海艳 却清吉腥甜葶藶之八 除喘肺癰甘益脤寒 塗腸痔殘 五膏理嗽咽 流金丹清痰降火 入参服大剤 不補中剤 凝滞大剤依通遠大参湯 桔膏不得 但剤涼腸桔 則皮金丹麻白没薬 填胃之捉使 苑百杜 黄仲景常用 可任紫苑五味 補飲桑白防风 実閉通 寒熱温涼各方 还亦轻重 復急括不祥明

手陽明大腸庚金之腑 脉居右寸 実則脉実 傷熱而腸满不通 辛温可温瀉 虚則脉虚 傷寒而腸鳴泄瀉 補当酸涼 芩黄連而解諸毒 枳殻厚朴可便除腸风 防川烏荊芥臓毒 青巻柏黄芪 劇中六神曲枳 宜調利閉带 大万中散可正 利止潤腸通秘 麻仁丸果有神效 利滞槐星六磨湯 宜参芎功 痔漏無痛 焦癖黄麝 研大揭胆 水磨繳丹水劑 痢腸疾姜茶並治 生效仙梅谷飲 方書可見 腸内癰正現 湯而加減随宜 十全将古增減可

足陽明胃倉戊土之腑 脉居右関 胃寒平調五臓 安諸実則脉実大 舌口乾而腰下腫瘍 宜瀉胃 虚則脉虚 腹痛腸鳴 而胃虚浮薬可温補 [illegible]実熱等必口内瘡乾 [illegible]黄散而得致 [illegible] 晋黄苓痛人 [illegible]数 [illegible]竹茹湯名

湯而頰咽喉爲痛沉香散瘧宜痛兩目積眉 人參治痛胃之良 豆蔻神積筆之冷 附藥不停著者葉人參

橘皮心脾刺痛砂仁香附烏沉胃冬生薑半夏理中官桂飲兩丸 蒼朮久陳皮 黃芪清癖癖 凡其效

砂黃芪治消渴益圓甘草一錢亦治風 砂子治遺之疳 芩葉益用姜炒 酸咽理 下霍亂轉筋肢逆冷木瓜甚效

吳茱萸治癥瘕腸痛善逐水 茯苓固胃 治胃虛咳逆人參甘草 伏苓 黃芪陳皮 胃寒痰嘔 茯苓葉丁

香橼半夏補虛 火行薊甘草橘仁皮 或加枳實扶脾 橘皮良姜丁半夏冬草生姜 上部木腸 下部生腸

老官無極湯 搽法宜篩 三部俱急人近帶數 其內產滑 利法宜

足太陰

脾經己土之臟 脈居右關 其利飲食消而飢 膚滑澤運利 身體痛而四肢不舉 脾虛腹脹生乾 口苦唇黑

死之當白朮健脾消食而去皮 枳實人參後土和氣 須半夏橘仁 柴胡除不思食 佐之升麻黃芪去百

滯之火補之當歸

○萬針膏藥 白丁香二錢 礦砂 人言二分 蝦 巴豆十粒去油 乳香沒藥 雄黃 龍骨各 二分 黑鉛 各 射 二分

右為末面糊為條兩頭尖長一寸 曬干看瘡大小針破插藥條 外用膏藥封固無膿自潰三日一換 如膿三日自消 增寒發熱服十宣散

○消毒先生蟾酥丸 專治一切無名腫毒 蟾酥二錢好酒化開 乳香沒藥銅綠各二錢 血竭 寒水石 雄黃三錢 但丸 麝 二分

蝸牛廿個 蟾蜍一枚 沒 右為末搗蝸牛如泥為丸如綠豆大 每服一丸生嚼葱白三寸放手心男左女右將葱 白 湯下出汗

○接骨蟾酥丸 紅麻子一兩 雄黃 飛羅面各等分末 右為末端午日 人乳化蟾酥為丸桐子大 每服二三丸 冰香 一丸入瘡口

○治左右眼丹方 研黃柏末入人乳調塗腫處神驗

人生之有經絡猶地之有界分治病不知經絡猶捕盜不知界分其能無誅伐無過之辜乎
岐黃問答以經絡為主根經絡一明然後知症見何經用何經之藥以治之可然萬療如古之盤術者
自有條以居手之脉各係如後之本以係經脈一經開兩傍係足少陽胃經又開兩旁係足少陰腎經又
開兩旁係足陽明胃經又開兩旁係足太陰脾經此皆在腹中長其乳之左上左旁係手太陰肺經
手少陰心經手厥陰心包絡經也又開兩旁脇在兩脇係足厥陰肝經又脇之後背之旁係足少
陽膽經在足之兩旁至兩外係足太陽膀胱經居脊之中行係督脉一經手之外面係
手三陽經手之內面係手三陰經足之外面係足三陽經足之內面係足三陰經外乃手足
陰陽經所會如耳前後係手足少陽經巔之上下係手足陽明經兩脇旁係手足太
陽經其巔之上乃係督脉一經又凡各經支別交會與足三陰皆循喉嚨挾舌本又
足厥陰循臂脉會于巔頂未得備詳分寸起止處乃十四經之大畧也內經所謂分
肉有正指此耳至于奇經八脉亦皆有起止病患如倘如脇痛便知其為肝經不和

凡男婦大小皆可護瘡用藥稍近陰便於其為胆經的又當隨症加減矣由此言之

則凡十四經所在皆可類推也

○七珍膏 治一切腫毒并楊梅瘡 當归 白芷 各五錢 乳香 二錢 巴豆 石粒 蜈蚣 二條 川山甲 五片 木鱉子 十个 丹 八兩 油 一斤

加桑枝 柳枝 槐枝 桃枝 椿枝 熬成膏

○治疔瘡對口髮疽腦疽方 荔枝肉 人指甲 二錢 牛黄 珍珠 五分 布包 搗粉 白蠟 三錢 熔化 離羅面 京 銀硃 半錢

鉛粉 一錢半 共為細末 加以垢 搗如糊 塗患處 每鐘 以井水潤之

○點瘡紅玉膏 點粉瘤結核痣如神 生石灰 水化開 糯米 一合 燒酒 浸 研成粉 用蒼术灰 荆灰 棗木灰 茄葉

灰 蠶桑梃灰 五様 淋汁五碗 並澄清 入斑毛 四十个 山甲 五片 先煎至二碗 候冷 入乳香 腦子 末 糯米粉灰研攪成 膏 千川燒酒調之

○滚臥上推毒或脫毒方 飛丹 二錢 官子 粉炙 一兩 枯凡 五錢 共為末 猪膏 隨調塗 已破者 乾摻上

○定痛流氣散 治手背發 人參 當归 川芎 甘草 黄芪 烏药 只壳 紫蘇 防風 芍药 白芷 各等分 水煎服

○定痛流氣飲 治腳心瘡 鞋帶瘡 茯苓 白芷 烏药 甘草 香附 紫蘇 人參 黄芪 當归 只壳 桔梗 川芎 紫蘇

○檳榔丸 能逐除內濕熱流毒 檳榔 只壳 各五錢 大黄 四兩 木瓜 两半 木香 三錢 防風 五錢 共為末 蜜丸 桐子大 每服 廿丸 空心 白湯

內托定痛散 治便毒 人參 黄芪 厚朴 紫蘇 烏药 川芎 甘草 只壳 桔梗 官桂 檳榔 當归 防風 白芍 白芷 水煎 並服

○洗痔漏方　木别子又々　川椒五分半　透骨草五分半　黄白术半　槐条、不拘多少　熬水洗

只丸子　蛇床子　黄连　草乌各五分　雄黄　山栀各半　黄柏半　川乌　枯凡各三分

共为细末炼蜜为丸如豆大丸每服一丸上一丸能自行病下如不下再服再服（有小儿不可吃此丸）

○骨痛三千散治瘰外重疮人参熟附木香、附子当归乌药芍药防风甘草官桂黄芪口羌桔梗厚朴白芷姜枣煎服

消瘰疬方　香油一两　蜈蚣　四条　油内炸焦去滓入松香二两成膏入铜绿二分　研调均热水煎化摊贴为名消

○流毒流气饮治发痘时淫毒人参桔梗口羌防风柴胡川芎前胡芍药当归羌活白芷甘草姜枣煎服

○鼠疮烂气疮鲜猫儿眼睛草捣烂熬膏贴疮口

○肝毒流气饮治肝饮治眉风毒耳门疮耳根毒频疮疽火胸带紫苏桔梗口羌防风柴胡羌活独活芍药川芎白芷乌药当归茯苓陈皮

○腿足麻木方　木瓜一斤　地骨皮二两　透骨草二两　川椒二两　艾子壹两　黄连半斤　槐条一两　熬水温洗　出田生柒

○肾毒流气饮治发背腰疽羌活木瓜独活当归紫苏桔梗羌活甘草防风厚朴官桂白芷芍药茯苓陈皮半夏乌药黄芪姜枣煎服

方　焰黄硝半分　黄丹一两　皂凡一两　雄黄、五分　朱砂二分　共为细末炒锡镕化成膏茶匙到底上

○肝流气饮治火毒疮生胃疮人参桔梗枳壳甘草防风前胡羌活独活芍药川芎青皮荆芥石蓬薄荷　摊遂疮贴

治赤白癜風方　將患處擦破用生貝母醋研塗患處即愈

內托流氣飲治上中下三發腦疽不立人參黃芪川芎芍藥當归防風官桂烏藥厚朴甘草

治癬方　用綠豆半升裝磁瓶內用糠火攢緊罐口朝下瓶上用炭火蓋嚴底下用碗接放磁碗內接豆油調擦甚效

治麻骨疤方　若從頭麻至心口窩者死從腳麻至膝盖者死用人糞燒灰豆腐漿調服

小兒喘嗽方　麻黃防風荊穗各三分為細末綠豆五分同研細面杏仁煎湯調服並治不止者　量兒大小服之

斷[illegible]方　川貝母五面天草共為細末酌量與之

瘰癧鼠瘡服方　元參牡蠣牡蠣等分面糊為丸如桐子大白湯送下

咽閉喉風　用白礬如芡實大在鐵勺內林時入巴豆一枚枯干加射少許為細面用葦筒吹入咽中流出惡涎即愈勿咽下

清心流氣飲　茯苓澤瀉麥冬白朮朱苓陳皮防風羌活紫蘇烏附川芎紫蘇甘草芍藥姜枣煎服

鎖喉瘟毒方 此症類頭毒之象初腫之時用明亮白礬搥碎大人用二錢小人一錢陰陽水調服其效如神

瘟痧症 痧藥方用蒼朮三兩米泔浸六錢 大黃六兩焙干 公母丁香各三錢 飛砂三兩六錢 明雄三兩六錢 麻黃三兩六錢 射香三錢 甘草二兩四錢

天麻三兩六錢 蟾酥九錢用汪燒酒化開研細末 共爲極細末江米湯爲丸如小米大每服十數丸白水送下或三四丸研碎吸鼻内取嚏

○護心托裏散治癰腫牙痛上中下三發未出膿者 人參 黃芪 當歸 川芎 白芷 甘草 烏藥 官防風 枳壳 桔梗 茯苓个 姜棗煎服

○敗毒流氣散治騎馬癰 人參 桔梗 只壳 甘草 防風 紫蘇 川芎 羌活 烏藥 白芷 紫穗 姜棗煎服

托裏追毒飲 人參 黃芪 桔梗 甘草 厚朴 枳壳 烏藥 白芷 川芎 防風 黑牽牛三錢微炒研 水煎服

○真人活命飲 金銀花 歸尾 貝母 花粉 防風 白芷 陳皮 甘草節 乳香 沒藥 赤芍 角刺 山甲 酒一盅煎服

此三方治騎馬癰 此瘡發于腎經虛熱所致 生肛門前陰囊後界空中 名懸癰 如蓮色過度嗜欲厚味所致 治當滋腎水

補氣血扶脾胃寧心志益元陽 初用敗毒流氣 次用托裏追毒 真人活命

桃仁承氣湯治內癰 癰在內何以別之 然心癰不時吐鮮血心中微微作疼 肺癰咳嗽吐膿腥臭 大腸癰大便出膿血 小腸腸癰

轉側有水聲腹響 肚癰臍癰轉側有水聲膿血自臍中出 宜服 桃仁十五粒 瓜蔞二錢 大黃五錢 芒硝二錢 桂枝一錢 丹皮

治腸風便血方 生軍八分 柴胡 羌活 獨活 川芎各八分 雲連 木瓜各八分 桔梗 杜仲 槐花 當歸 赤芍各半 只壳 米壳

接骨散用桑柳桃槐楊五樣五月五日採取

陰干爲末收貯 又用旱公牛角火煆爲末 面糖用烙 貢米面同五棓子酒和成餅

角面搽于餅上 果于患處 外用布縛好 如骨折碎撥正 细听自有响声其骨自和

○要咽喉生毒如橄而实硬者以麻药陆门箭点上如法钩割

○九要点麻药割净须用烙铁加桐油入炭火上煅红轻烙二次

○十要灸颊车二穴在耳下三分陷中如小麦大灸三壮长风一穴在脑后下寸灸三壮又少商二穴在手大指外侧一韭叶许即是

单鹅

此症生帝中一边或左或右当针破点驱风散

变鹅

此症生帝中两边左属心经右属肺经相对而生当针颊车曲池少商等穴後針鹅之根不可留动恐血流汨经後变为伤寒则难治矣

梅核

此症形如梅核甚硬或腮下无肿外宜刺红取血内服回疾点上麻药割去肤肉烙之绝其根

变松子

此症生喉两傍掩舌三四个外肉贪大者钩割烙小者针破用驱风散点之自愈

单松子

此症生掩舌下左属心右属肺治法与双松子同

双燕

此症生咽喉两边红肿去短不齐针破点药次针舌下两青筋中间勿针

单燕子

此症治法与双燕子同

鱼鳞

此症生掩舌傍状如鳞施药道割轻者点药自针舌下两边青筋

重腭

此症上腭红肿而白甚痛生帝中牖如腐臭与锁喉风相似宜早服三黄汤则内入或胁刺痛或风热结于心经言舞缩多致不救

木舌



此症舌硬肿不能举动舌下又生一舌或外腮皮面赤肿先于外面赤肿处用利刀出血再针舌下两边青筋出血治之宜早迟则腐烂舌根

帝毒

此症嗌舌腫硬大如鳩子紅色逐下之紫色者不治
宜甘桔湯毋要針破出血治宜仔細

舌下蓮

此症舌上出峯如蓮須針兩邊之峯中間不可針慎之

擒食

此症因飲食熱物所致或喉或舌以針挑破出血愈

閉鎖喉

此症初起與纏喉相似但一時閉塞頷滿咽喉腫
塞不通也取新竹子火燒中間捺兩頭白汁一二口
與病者吞下待甦醒急服三黃湯去其毒熱再
內外破血二里者不治此症十死一生慎之

咽瘡

此症或生紅瘡或生黃泡日久滿口俱生針破激出血球
上藥針少商穴

血瘀　斑毛三分　滑石三分　每三服　斑毛十　白芷三分

下疳　甘石　乳香　血竭　黃連　輕粉　五分　冰片一分

慢喉風

此症初起喉管內兩傍刺痛嗌舌兩傍有紅筋兩條攢攻嗌
舌之下或紅紫腫痛或生小黃泡以針刺破出血或不痊癒
手足寒戰類如驚風之狀先服三黃湯甘桔湯次服清風散
如胸膈刺痛用涼膈散調之醫人失其調理每致一月半年
方愈者有之可不慎歟

懸旗

此症舌腫不可下針甚者爛喉者落尺頰內者不宜治　初起時上服風散

撥牙床

此症起于牙床上腫痛用撥針二三日久者出難治用鹽擦之

牙瘡

此症牙根或上或下生泡針出膿血自愈硬者成珠者施麻藥如法割盪

托牙

此症宜早刺出血否則肉裡生出牙不可針日久膿出骨爛如法治之

象牙　乳香　沒藥　兒茶　雄精　半　白礬二分　白龍丹

粟殼五分 青皮四分 干姜五分 厚朴七分 當歸五分 赤芍 白芍 生地 川芎各二分 麥芽一錢 山甲二分 通草一錢 附子

陳皮四分 桔梗 茯苓 枳殼四分

湧泉散 下乳

回乳 歸尾 澤蘭 赤芍三分 牛膝二分 麥芽五分 蒲黄八分 桃仁一錢 川芎 生地五分

開骨散 當歸 川芎各五分 龜板八分 血餘炭二分

連翹敗毒 金銀花一錢 花粉三分 浙貝二分 黄芩三分 薄荷一分 菊花三分 加 桔梗二分 元參二分 赤芍三分 甘草一分 生地四分 生军三分 竹葉

清瘟解毒 連翹一錢 黄芩二分 竹葉三分 花粉三分 牛子一分 元參三分 川芎一錢 桔梗二分 升麻二分 白芷 紫蘇二分 一錢 赤芍 生姜 三分

口齒 白清胃散 月石二分 硼砂一錢 元明粉二分 冰片三分

紅 清胃去火 珠粉 一分

△清涼散 硃砂 月石 甘草 冰片

咽喉口齒藥 金果 冰片二分 牙皂一分

膽礬 白礬 雄黄 硼砂 薄荷各一分

綠袍散 黄柏 青黛三分 薄荷五分 兒茶五分

赴宴散 黄連 干姜五分

牙疼方 良姜 草烏 細辛 荊芥 乾姜 川椒 白芷 乳香 各等分 牙疼止痛

牙疼藥 青鹽 硼砂 樟腦 火硝 各等分

婦人隱疾前陰諸症有陰腫陰痒陰瘡陰蝕陰挺下脫諸証其腫也或如菌如蛇如帶如雞冠種種不一而推其因總不外乎濕熱與六者方九味芦薈丸主之若由恚怒動肝火佐以加味逍遙散或肝經濕熱極盛佐以龍膽瀉肝湯或脾氣虛弱中氣下陷佐以補中益氣湯若思慮傷脾脾氣鬱結佐以加味歸脾湯若腎水不足佐以六味丸加歸芍庶克收功夫此症雖屬濕熱而亦兼虛弱者多若不顧根本而專用清涼恐不免寒中之患也治者慎之

九味芦薈丸 治三焦肝膽經風熱目生雲翳或頸項瘰癧耳內生瘡或牙根蝕瘡頰腮腐爛下疳陰蝕諸瘡　芦薈　胡黃連　當歸　白芍炒　川芎　蕪荑各一兩　木香　甘草　龍膽草酒炒　共為末米糊丸麻子仁大每服一錢或一錢五分開水下

又龍膽瀉肝湯 治肝經濕熱兩拗腫痛或小便澀滯下疳潰爛等症　龍膽草酒拌炒　黃　澤瀉各一錢　車前子　木通　生地各八分酒洗　山梔　當歸酒拌　黃芩炒　甘草炒

兒疳積痰嗽喘方 銀柴胡 姜蚕 胡連 蟲谷 廣皮 杏仁 煎服 肥兒丸每日服之

腹痛後較見血此乃氣滞血瘀作痛以蘇梗木香 附 元胡 穀砂仁以行氣破滞 乳香沒藥以活血通滞血定痛

引 降香 橘 行結氣使氣行則瘀散通則不痛也 又方 白蔻仁二分 姜朴 蘇梗 香附 木香 穀砂仁 乳香 降香 橘 亦行破滞也

牙疳散 青代 黃柏 二錢 兒茶 人中白 煅 各二錢 芦薈 珊瑚 各半錢 冰片 五分

擦牙散 生鹽 煅 各二錢 青鹽 一錢 旱蓮草 二錢 細辛 白芷 各四錢

珍珠散 石決明 錢 赤石脂 六錢 乳香 沒藥 輕粉 各四錢 龍骨 六錢 海螵蛸 三錢 冰片 一錢 珠子 錢

生肌散 乳香 沒藥 兒茶 血竭 龍骨 海螵蛸 決明 各五錢 象皮 赤石脂 各二錢

下疳散 橄欖核 煅存性 輕粉 兒茶 二錢 〇一 梅 坐參 千大黃 兵霜 二五 各三錢 赤金 十張 煅

一厘散 歸尾 紅花 各二錢 乳香 沒藥 雄黃 兒茶 一兩二錢 血竭 硃砂 各半錢 麝香 二分 冰片 一錢

紅粉散 枯礬 海螵蛸 胭脂 各一錢 麝香 二分

碧云散 鹅尾不食草 黄柏 细辛 一钱 川芎 薄荷 防风 白芷 荆芥 蔓荆子 泽兰 代加冰片 各五分

玉容散 白芷 白芨 防风 白丑 花粉 各五钱 白敛 白附 藁本 各二钱 三柰 姜蚕 各四钱 干松 陆三钱

茉莉粉 对羊胭脂 球珠

秦薄荷 防风 荆芥 归尾 赤芍 白凡 胆凡 生地 苡仁 各一钱 细辛 荆芥 羌活 川芎

菊花 黄芩 各二钱 清桃 桔梗 黄柏 豆根 薄荷 各一钱 青代 川连 二钱 胆矾 二钱

利马锭 红粉底 海螵蛸 象贝 轻粉 等分 下疳散 马前炭 五分 铜粉 五分

拔毒散 黄柏 大黄 独活 一两 白芷 青代 五分 枯白凡 胡椒 白面 治疮疥

整定痛散 当归 牛夕 木瓜 杜仲 生地 各一钱 川芎 香奇 肉桂 山甲 生姜 白芷 红花 二钱

乳香 没药 各五钱 香附 二两

救苦散 霍乱 槟榔 兵郎 一两 苍黄 史君 栀子 五钱 枯凡 青棒 樟脑 一两

珍珠白玉饼 南星 半夏 贯众 巴豆霜 葶苈子 朱砂

萬天玉手

治痔瘡方 全蝎三枚去頭足 土鱉二个去足 大蚕虫二个 全焙干 芝麻一撮 銅勺内炒研為末 用好老糖調 五更酒送下

又方 每歲用鱉甲半錢炙 全蝎三枚去頭足 新瓦上焙干用 雄黄二分 共研極細末 芝麻一撮 另炒 白糖拌 五更時送服 十歲服十服 二十歲服廿服 即愈

小兒七珍丹 硃砂 雄黄 竺黄 姜蚕 全蝎 胆星各分 巴豆霜五分 為細末 蒸倉米糊為丸 如粟大 硃砂為衣

菜部

利氣化痰 子消食下氣 治黃疸皮膚及目黃如金色小水短赤白濁水閉

韭汁 去腸中瘀血 初生小兒以汁灌之即吐惡血永無病

蒜小蒜 輕身不饑耐老消谷 治霍亂痢疾赤白帶下 韭白同柏葉煎 治赤痢解毒乾嘔

葱 治霍亂轉筋 通大小腸奔豚腳氣腸氣 解達表和裡 除肝經邪氣 解百藥毒 跌打損傷 傷寒頭痛
妊婦四五個月忽胎下血 葱白一把煮湯飲之即安 大小便不通 將葱白填臍中 艾火灸七壯立下

芫荽 治利大小便 腸風頭痛 小兒痘疹不出 欲令速出 用酒煮沸噴身令遍即出

大蒜 散癰腫䘌瘡 消食下氣 爛痃癖 辟瘟疫 中暑霍亂轉筋 爛臍濕小便 鼻衄不止 搗碎塗腳心
癰疽發背惡瘡腫核 初發取紫皮獨頭蒜切片貼腫心 艾灸 痛者灸至不痛 不痛灸至痛
魚骨鯁 以蒜塞鼻中自出

芥菜 治痰在皮裡膜外非此不能達

莧菜子 治青盲白翳 明目 利大小便 去血 不可且善走 与馬齒莧同食不服 臨產食之易產 肝經風熱上攻眼
目赤痛生翳 莧達降 名明目末茶服

馬齒莧 治目盲白翳 利大小便 赤白帶 去寒熱 殺諸虫 止渴 破癥瘕 去白虫 治痢疾 塗白禿 瘟瘡

薺菜　治眼目暴赤腫痛去翳障

異傳不出痘神方　大麻子卅粒去殼揀肥大者用　硃砂一錢　元射五厘真淨者用　先將硃砂射香研極細末後入大麻子共研成膏　於五月五日擦小兒頭頂心　前後心　兩手心　兩腳心　兩臂心　兩肥灣　兩膝　共十三處　俱要擦到不可短少　擦如錢大　勿使藥有餘剩　擦完不可洗動　聽其自落　本年擦過一次　出痘數粒　次年端午再擦一次　出痘三粒　再次年端午又擦一次　永不出痘矣　如未週歲小兒　于七〃七月　九月九日　依法擦之更妙

△痔漏丸　當歸酒洗　象牙末各五錢　槐米四兩酒洗　滴乳石各二錢去油　槐樹上蜂窩一個焙微炒　共研極細末　黃蠟二兩為丸　如桐子大　每服五六十丸　空心漏蘆湯送下　待退出肉管用旁之之

治痔漏不拘遠年近日　膿血通腸　其膿之化為除根　此方異人所授　救人一天　此止人疼痛　救活人矣矣

胎元三个　即男子臍帶新瓦上焙干存性　陳棕七年數十年者佳燒灰存性　牛黃三分　刺蝟皮三个酥炙　地榆晒干三錢　槐角子五錢肥大者瓦上焙干存性

共研極細末　蔴油為丸　如黍子大　如不成丸　加糯米粥少許　即成丸矣　每服七空心　白水下　三日化為止痛七日平滿　血清膿止　十日除根　又方苦胆丸　苦胆一具　柿餅三枚　木耳三錢　鍾乳石五月

治服藥者用雄雀屎湯作服之理　腹中痞痛名陰坝伏果老秋干姜桂心艾葉為丸解全治痼

風虫牙痛

紅牙大戟三兩半　草河車三兩半淨末　麝香三錢淨肉　腰面雄黃四兩　毛茨菇四兩去淨穿切片　五倍子三兩半

千金子霜二兩四錢　冰片二錢　硃砂四兩飛淨　共研極細末以湯圓搗爛印定

太乙紫金錠治法開列於後

一治山嵐瘴氣暑溫邪氣用少許噙化

一治中風卒倒牙關緊急姜湯磨服

一治臌脹噎膈麥芽湯磨服

一治疔毒惡瘡無灰酒磨服取汗再用涼水磨塗患處已潰勿服

一治絞腸腹痛霍亂吐瀉用姜湯磨服

一治咽喉閉痛薄荷湯磨服

一治中蠱毒及飲食諸毒以磨得吐利即解

一治白痢姜汤磨服 赤痢滚水磨服 一治猘犬咬并毒虫所伤磨服再用茶水磨涂患处

一治小儿痰涎壅盛急慢惊风薄荷汤磨服 一治邪疟温酒磨服

一常佩在身能祛邪辟鬼魅孕妇勿服

对口搭手凡属瘰疬阴症大抵皆可治 用鲫鱼一个去肠肚鳞尾将墨丸填满黄泥封固炭火煨透存性

为细末香油调敷

鯉魚

治水腫利小便痃癖氣塊下浮汁消腫止反胃 目熱赤痛（胆） 青盲赤腫翳痛（魚腦） 女子赤白帶下陰瘡（用骨）

魚鮓 鱗燒灰吹鼻衄

石首魚 鯗

治石淋 解砒毒 野菌毒 蟲毒 開胃益氣 宿食即消 腹脹下利

鯽魚

治溫中下氣 腸癰 惡核腫毒不散 女人陰瘡 殺蟲止痛 腸風血利 反胃（同礬丸） 痔瘡 水腫（用茶葉填燒） 消渴 飲水 酒積下血

小腸疝氣（茴香） 婦人血崩（乳香） 走馬牙疳（敗不拘蕪荊） 目翳用頭燒灰 胆塗陰瘡陰蝕

鰻

治痔瘡殺蟲 女人陰蝕蟲癢 腳膝濕痛 赤白帶下 蟲心痛 疳瘡生瘡（用血） 瘡痢腸風（骨灰）

鰌魚

治醒酒消渴 用鰌魚十頭陰干去頭尾燒灰，荷葉每服二錢

蝦

治壯陽補腎興陽 作羹治鱉瘕 托痘瘡 下乳汁 膝燒灰傅陰瘡 瘻瘡 月蝕瘡 產後風搐 血運（酒） 八般頭痛作吃用蔥酒服

龜

治赤白帶下 破癥瘕 痎瘧 陰蝕濕癢 女子陰瘡 瘧不止用殼燒存性酒送 筋骨疼痛 二年寒嗽

止瀉血痢 版治血麻痹脫肛 甲陰血不止 去廠止血 勞倦四肢無力 腎虛腰痛（大勞補陰 灸酒）

鱉

治腹癥瘕 堅積去瘡 陰蝕 血瘕腰痛 宿食癥癖 切痔漏 冷瘕 骨節間勞熱 崩漏 墮胎 消瘡腫 腸癰（灸酒牛乳）

陰毒腹痛 婦人經脈不通 產後陰脫 吐血不止（炒為末） 腸癰內痛 陰頭生瘡（鱉甲灰傅） 血瘀口噤喝僻（同烏頭末）

蟹

蟹爪破胞墮胎 墮生胎下死胎 殼燒存性塗凍瘡及蜂蠆傷 酒服治婦人兒枕骨痛血崩淋瀝腹痛

黃蟹汁 治喉風腫痛 殼炒解漆毒

真珠

治點目去翳障 除痰 除小兒驚熱安魂魄 下死胎胞衣 卒忤不言 用雞冠血丸 子死腹中

海蛤 又名鏡蛤

治氣腫水腫 用海蛤海帶海藻海螵蛸海昆布鳧茨荔支殼等分 急流水煎服 理濕 清熱利濕

老痰頑痰 疝氣白濁 同香附末姜汁調服 定喘嗽 治浮腫 利小便 化積塊 心氣痛同香附末服

淡菜

治吐血久痢 腸鳴腰痛 疝瘕 帶下 產後積血腹內冷痛 益陽事 理腰膝氣 消癭氣

田螺

治目熱赤痛 理濕 利大小便 腳氣衝上小腹急硬 下水氣 小便不通同鹽搗爛敷臍下一寸三分即通

螺螄

治痢止渴 理濕 解熱 利大小便 消黃疸水腫 存陳服治胃膈痛

鴨

治補虛除客熱 和臟腑 大腹水病 用青頭雄鴨煮汁飲 厚蓋取汗 又白鴨一只以豉半升同姜椒入鴨腹中縫定蒸熟服之 治水腫通小便 血解諸毒及生金生銀丹石砒霜諸毒 及溺水死者灌之即活 卒中惡死 用雄鴨向死人口斷其頭瀝血入口 外以竹筒吹其下部 氣通即活 解百虫毒

小兒白痢似魚凍者 白鴨殺取血滾酒泡服 蛋同雞子清塗熱瘡腫毒即消

野鳥

雞

治殺腸虫 切出水氣浮腫 補中益氣平胃消食

治補虛溫中止血通神 冠血主乳難 瘡白癜風自縊死者心下溫刺血滴口中 利小便 反胃吐食用烏雄雞一只五味煮爛入胡荽子半斤於腹內煮食之愈 烏雄雞補中止痛 止肚痛心腹惡氣除風濕麻痺

安胎 黑雌雞治風寒濕痺 安心定志 治血邪 治癰疽排膿 烏骨雞 益氣治勞瘦 補精

崩中帶下一切虛損 爛弦風眼 對口毒瘡 諸虫入耳 驚風不醒 烏骨雄雞血抹唇上即醒

雞內金 治洩利小便頻遺 除熱止煩 血痢崩中帶下 腸風瀉血 反胃 消酒積 喉閉乳蛾 屎 下氣通利大小便

心腹鼓脹 消癥瘕 解金石毒 雞子 賊風麻痺 痘痢 除心下伏熱 嘔逆用雞子煮山查花薄荷葉湯送

抱出卵殼 研末磨障翳

治產後下痢 用雞一只作餛飩

雉 即野雞

白鴿

治疥瘡食之愈 血治諸藥百虫毒 解瘡毒痘毒 屎治陰症腹痛 鴿子糞炒研極細 溫酒中

和白附消損眼即愈 積虫腹痛 鴿糞炒研和服 冷氣心痛 鴿屎燒存性酒服一錢

項上瘰癧 鴿屎炒研飯和丸桐子大 每服三錢 每服丸米飲下 痞 治除症瘕 用鴿屎炒老雄一枚去腸

入糞及屎末五錢 以桑柴火煨成炭為末 空心生薑湯服 每服二錢愈

本糞雄者尖 名白丁香 消翳障

風虛目瞎
肝虛目暗
眼赤流淚用五倍子
蔓荊子洗淚雞窩胆川
連之
治咳嗽吐血如陽
盛生血清營湯
犀角源清骨散主之
柴胡白芍麦冬
甘草丹皮地骨皮
青蒿鱉甲知母
黃芩川連加童便

臟腑虛實標本用藥式

肝藏血屬木胆火寄於中主血主目主筋主呼主怒

本病諸風眩運僵仆強直驚癇兩脇腫痛胸肋滿痛嘔血小腹

疝痛吐涎痃瘕女人經病

標病寒熱瘧頭痛吐涎目赤面青多怒耳閉頰腫筋攣卵縮

丈夫癩疝女人小腹腫痛陰病

有餘瀉之

瀉子甘草

行氣香附芎藭瞿麦牽牛青橘皮

行血紅花鱉甲桃仁莪述京三稜穿甲大黃水蛭虻虫蘇木丹皮

乳癰係肝脾胃二經初
起腫痛用人參敗毒散
神散瓜蔞散加味逍遙
散治之腫自消
乳岩係肝脾二臟鬱怒
初起小核結於乳內用加
味逍遙散並歸脾
湯
千金牡丹散治腸內癰
牡丹三錢薏仁五錢
桃仁十粒瓜蔞仁二錢

鎮驚 雄黃 金箔 鐵落 真珠 代赭石 夜明砂 胡粉 銀箔 鉛丹 龍骨 石決明 搜風 羌活 荊芥 薄荷 槐子 蔓荊子 白花蛇 獨活 防風 皂莢 烏頭 白附子 僵蠶

不足補之

補母 枸杞 杜仲 狗脊 熟地 苦參 萆薢 阿膠 兔絲子 補血 當歸 牛膝 續斷 白芍 血竭 沒藥 川芎 補氣 天麻 柏子仁 白朮 菊花 細辛 蓉 蒙花 決明 谷精草 生姜

本熱寒之

瀉本 芍藥 烏梅 澤瀉 瀉火 黃連 龍膽草 黃芩 苦參 豬膽 攻裏 大黃

標熱發之

和解 柴胡 半夏 解肌 桂枝 麻黃

心藏神為君火包絡為相火主血主言主汗主笑

内傷

外感

哮喘 痰火内鬱 風寒外束

吼喉中如拽鋸聲

難者為哮

喉如鼾聲者

為喘

外感風寒宜表散

麻黄 杏仁 陳茶

熱加石羔 [illegible] 甘

因痰而得以[illegible]乱

[illegible]藶丸下之

[illegible]麻黄 [illegible] 杏仁 陳皮

因食而得 [illegible]

[illegible] 半夏 大皂角

本病 諸熱瞀瘛驚惑譫妄煩乱啼笑罵詈怔忡健忘自汗諸痛痒瘡瘍

標病 肌熱畏寒戰慄舌不能言面赤目黄手心煩熱胸脇満痛引腰背肩胛肘臂

大寔瀉之

瀉子 黄連 大黄 氣 甘草 人参 赤茯苓 木通 黄蘗 血 丹参 丹皮 生地 元参 鎮驚 硃砂 牛黄 紫石英

神虚補之

補母 細辛 烏梅 酸棗仁 生姜 陳皮 氣 桂心 澤瀉 白茯苓 茯神 遠志 石菖蒲 血 当归 乳香 熟地 没葯

本熱寒之

瀉火 黄芩 竹葉 麦冬 芒消 炒塩 涼血 地黄 梔子 天竺黄

未有哮喘之候遇
牙龈肿发宜补肾丸
熟地 山萸 山药 鹿茸
丹皮 牛膝 茯苓 泽泻
五味 补骨脂
凡哮喘和散宜服
麻黄 陈皮 薄荷
桂心 紫苏 桑白
白僵蚕 陈皮 杏仁
茶 甘草 桑皮
胸膈积热心火烧肺
久患脾风宜牵牛
麝香
黑牵牛 大黄 巴豆
加卷
病后气弱宜枳壳
四君加麦冬 五味子
大喘肾不纳气宜

標者發之

散火 甘草 独活 麻黄 柴胡 龙脑

脾藏智 属土 主营卫 主味 主肌肉 主四肢

本病 诸湿肿胀 痞满噫气 大小便闭 黄疸痰饮 吐泻霍乱 心腹痛 饮食不化

標病 身体胕肿 重困嗜卧 四肢不举 舌本强痛 足大趾不用 九窍不痛 诸痉项强

土实泻之

泻子 诃子 防风 桑白皮 葶苈

吐 豆豉 栀子 萝卜子 常山 瓜蒂 郁金 薤汁 藜芦 苦参 赤小豆 盐汤 苦茶

下 大黄 芒硝 青礞石 大戟 甘遂 续随子 芫花

土虚补之

陰陽並熱一池芍归
炮姜吴甘手足冷
附桂

哮喘不止用石羔半夏
瓜蒌仁陳皮麻黄以黄
杏仁甘草生姜

治食積作一切滞偏成痰
或食過厚滞印發
用蘿卜子蒸晒乾
猪牙皂燒存性
姜汁打麵糊丸

補母 脾 心 茯苓

氣 人参 黄芪 升麻 葛根 甘草 陳皮 青香 藿香 蘇梗 砂仁 木香 扁豆

血 白术 蒼术 橘皮 半夏 白芍 脾飴 大棗 干姜 木瓜 烏梅 蜂蜜

本 濕 除之

燥中宫 白术 蒼术 橘皮 半夏 吳茱萸 南星 草豆蔻 白芥子

潔浄府 木通 赤茯苓 猪苓 灌居

標 濕 滲之

開鬼門 葛根 蒼术 麻黄 獨活

肺藏魄 屬金 主氣 主哭 主皮毛

本病 諸氣膹鬱 諸痿喘嘔 氣短 欬嗽上逆 欬唾膿血 不得卧 小便數而欠 遺失不禁

標病 洒淅惡寒 傷風 自汗 肩背痛 冷臑臂前痛

氣實瀉之

瀉子 澤瀉 葶藶 桑白皮 地骨皮 除濕 半夏 白朮 白茯苓 薏仁 木瓜 橘皮 瀉火 粳米 石膏 寒水石 知母 訶子 通滯 枳殼 薄荷 木香 厚朴

杏仁 皂莢 桔梗 蘇葉 干姜

氣虛補之

補母 甘草 人參 升麻 黃芪 山藥 潤燥 蛤蚧 阿膠 麥冬 貝母 百合 天花粉 天冬 斂肺 烏梅 粟殼 五味子 白芍 五倍子

本熱清之

清金 黃芩 知母 麥冬 梔子 沙參 紫菀 天冬 溫肺 丁香 藿香 檀香 款冬 白豆蔻 益智 縮砂 糯米 百部 解表 麻黃 葱白 紫蘇

腎藏志 屬水 主胜 主骨 主二陰

内候

外候

本病諸寒厥逆骨痿腰痛要冷如冰足胻腫寒少腹満急疝瘕大便閉泄吐

利腥穢水液澄清冷不禁消渴引飲

標病發熱不惡熱頭眩頭痛咽痛舌燥脊股後廉痛

水强瀉之

瀉子 大戟 牽牛 瀉腑 澤瀉 猪苓 車前子 防已 茯苓 水弱補之補母 人參 山藥 氣 知母 元參 補骨脂 砂仁 苦參 血 五味子 黄檗 枸杞 熟地 鎖陽 肉蓯蓉 山茱萸 阿膠

本熱攻之

下 傷寒少陰症口燥咽乾 大承氣湯 寒溫 附子 干姜 官桂 蜀椒 白朮

標寒解之

内伤　外感

解表　麻黄　细辛　独活　桂枝　热凉　玄参　连翘　甘草　猪膏

命门藏精生血降则为漏升则为铅主三焦元气

本病前后癃闭气逆里急疝痛奔豚消渴膏淋精漏精寒赤白浊溺血崩带漏

火强泻之

泻相火　黄柏　知母　丹皮　地骨皮　生地　黄芩　茯苓　元参　寒水石　火弱补之益阳　附子　肉桂　益智　破故纸　沉香　川乌　硫黄　天雄　乌药　阳起石　茴香　胡桃　巴戟天　丹参　当归

精脱固之

涩滑　牡蛎　芡实　金樱子　五味子　远志　山茱萸　蛤粉

三焦为相火之用分布命门元气主升降出入游行总领五脏六腑营卫经

内伤

焦上主纳中主化下主出

本病诸热瞀瘛暴病暴死暴瘖躁扰狂越谵妄惊骇诸血溢血泄诸气逆上

冲诸痛疡疮疹瘤核

上热则喘满诸呕吐酸胸痞胁痛食饮不消头上出汗

中热则善饥而瘦解㑊中满诸胀腹大诸病有声鼓之如鼓上下关格不通霍乱吐利

下热则暴注下迫水液浑浊下部肿满小便淋沥或不通大便闭结

上寒则吐饮食痰水胸痹前后引痛食已还出

中寒则饮食不化寒胀反胃吐水湿泻不渴

下寒則二便不禁腹脇冷疝痛

標病則惡寒戰慄如喪神守耳鳴耳聾嗌腫喉痺諸病胕腫疼酸驚

駭手小指次指不用

實火瀉之

汗 麻黃 柴胡 葛根 荊芥 升麻 薄荷 羌活 石膏 吐 瓜蒂 浴 鹽齏汁 下 大黃 芒硝

虛火補之

上 人參 天 桔梗 桂心 中 人參 黃芪 丁 蒼朮 木香 草果 下 附子 桂心 麻黃 人參 烏藥 破故紙

本熱寒之

外感　內傷

上 黃芩〻連翹梔子知母元參石羔生地黃 中 黃連〻翹蘗石羔 下 黃蘗知母生芐石羔丹皮地骨皮

標熱散之

解表 柴胡細辛荊芥羌活葛根石羔

膽屬木為少陽相火為決斷之官土賊至之

本病口苦嘔苦汁善太息淡淡如人將捕狀目昏不眠

標病寒熱往來痞瘧胸脇痛頭額痛耳痛耳聾瘰癧結核馬刀

足小指次指不用

實火瀉之

瀉胆 龍胆 牛膝 猪胆 生棗仁 生酸棗仁 黃連 苦茶

補溫胆 人參 茯苓 半夏 炒棗仁 炒酸棗仁 當归 地黃

本热平之

降火 黃芩 黃連 芍藥 連翹 甘草

鎮驚 黑鉛 水銀

和 柴胡 芍藥 黃芩 半夏 甘草

胃

胃屬土 主容受為水谷之海

本病 噎膈 反胃 中满 腫脹 嘔吐 濕痢 霍乱 腹痛 消中 善饑 不消食

傷飲食 胃管當心痛 支两脇

外感

標病 發熱蒸蒸 身前熱 身前寒 發狂 譫語 咽痺 上齒痛 口眼喎斜

鼻痛 鼽衄 赤齄

胃寔瀉之

濕熱大黃芒硝 飲食巴豆神曲山查阿魏硇砂三稜輕粉鬱金 補濕熱蒼朮白朮半夏茯苓橘皮生姜 寒濕干姜附子草果官桂丁香肉豆蔻人參黃芪

本熱寒之

降火石羔地黃犀角黃連 標熱解之解肌升麻葛根豆豉

大腸屬金主變化為傳送之官

本病大便閉結泄痢下血裡急後重疽痔脫肛腸鳴而痛

標病齒痛喉痺頸腫口乾咽中如核鼽衄目黃手大指次指痛宿食

發熱寒慄

腸實瀉之

熱 大黃 芒硝 桃仁 牽牛 巴豆 郁李仁 石膏 氣 枳殼 木香 橘皮 檳榔

腸虛補之

氣 皂莢 燥 桃仁 麻仁 杏仁 地黃 乳香 松子 當歸 肉蓯蓉 濕 白朮 蒼朮 半夏 硫黃 陷 升麻 葛根 脫 龍骨 訶子 粟殼 烏梅 白礬 赤石脂 禹餘糧 石榴皮

本熱寒之

清熱 秦艽 槐角 地黃 黃芩 溫裡 干姜 附子 肉豆蔻 標熱散之 解肌 石膏 白芷 升麻 葛根

小腸主分泌水穀 為受盛之官

内傷　外感

本病大便水穀利小便秘小便閉小便血小便自利大便後血小腸氣痛

宿食夜熱旦止

標病身熱惡寒嗌痛頷腫口糜耳聾

實熱瀉之

氣 木通 豬苓 滑石 瞿麦 澤瀉 灯草　血 地黃 蒲黃 赤 茯苓 梔子 丹皮　虛寒補之 氣 烏 楝實 茴香 砂仁 神曲 益智　血 桂心 玄胡索

本熱寒之

降火 黃蘗 黃芩 黃連 連翹 梔子　解肌 藁本 羌活 防風 蔓荊

膀胱主津液為胞之腑氣化乃能出諸病皆干之

內傷　外感

本病小便淋瀝或頻數或黃赤或白或遺失或莖痛

標病發熱惡寒頭痛腰脊強鼻窒足小指不用

實熱瀉之

泄火滑石 豬苓 澤瀉 茯苓 下虛補之熱 黃蘗 知母 寒 桔梗 升麻 益智 烏藥 山茱萸

本熱利之

降火知黃 梔子 茵蔯 黃蘗 丹皮 骨皮 發散 麻黃 桂枝 羌活 蒼朮 防己 黃芪

引經朴使潔古珍珠囊

手少陰心 黃連 細辛

手太陽小腸 藁本 黃蘗

足少陰腎 獨活 知母 肉桂 細辛
手太陰肺 桔梗 升麻 葱白 白芷
足太陰脾 升麻 蒼朮 葛根 白芍
手厥陰心 柴胡 丹皮
足厥陰肝 青皮 吳茱萸 川芎 柴胡

足太陽膀胱 羌活
手陽明大腸 白芷 升麻 石羔
足陽明胃 白芷 升麻 石羔 葛根
手少陽胆 柴胡 青皮
足少陽三焦 連翹 柴胡 上地骨皮 中青皮 下附子

李東垣隨証用藥凡例

風中六腑 手足不遂先發其表羌活防風為君隨証加藥然後行經養血當歸秦艽獨活之類隨証用之

風中五臟 耳聾目瞀先疏其裡三化湯然後行經獨活防風柴胡白芷川芎隨証用之

血症

火乘血乃熱妄行上
奔而為吐血陽明絡
熱內逼
胃中積熱火逼出血
而妄行於從口出宜清火
胃火清胃散。鼻血
者肺也傷肺熱火炎
血乃清道於從鼻出宜
加味四君子湯。咳嗽吐
血宜滋陰降火為主。
大便下血糞前見血
宜芩連解毒湯。
糞後見血宜清胃
散不止補中益氣
加胡連

破傷中風 脉浮在表汗之脉沉在裡下之背搐羌活防風前搐升麻白芷
兩傍搐柴胡防風右搐加白芷
傷風惡風 防風為君麻黃甘草佐之
傷寒惡寒 麻黃為君防風甘草佐之
六經頭痛 須用川芎加引經藥太陽蔓荊陽明白芷太陰半夏少陰細辛厥陰吳茱萸巔頂藁本
眉稜骨痛 羌活白芷黃芩 風濕身痛 羌活
嗌痛頷腫 黃芩粘鼠子甘草桔梗 肢節腫痛羌活
眼暴赤腫活益服 防風芩連瀉火當歸 眼久昏暗 熟地當歸為君防風為臣 甘草甘菊之類佐之
風熱牙痛 喜冷惡熱生地當歸升麻黃連丹皮防風

清胃散 黑栀生地丹皮
當歸川連
加味四君子參朮茯苓
甘草桔梗麦冬山栀
黃芩竹葉灯心
滋陰降火湯 熟生地归
身白芍知母連蓮肉
元参麦冬川連花粉
甘草

黃連解毒湯
川連黃柏黃芩
山梔灯心
血府烏梅燒存性研末
米飲下
鼻血不止用大蒜一枚去皮
研如泥作餅如錢大左鼻
[illegible]心右鼻帖足心
[illegible]口韭菜搗汁一杯童子小便一杯溫服

胃虛牙痛　桔梗升麻細辛吳茱萸

風濕諸病　須用羌活白朮

風冷諸病　須用川烏

一切痰飲　須用半夏風加南星熱加黃芩濕加白朮陳皮寒加干姜

風熱諸病　須用荊芥薄荷

諸欬嗽病　五味為君痰用半夏喘加阿膠佐之不論有熱無熱少加黃芩春加川芎芍藥夏加梔子知母秋加防風冬加麻黃桂枝之類

諸嗽有痰　半夏白朮五味防風枳殼甘草

欬嗽無痰　五味杏仁貝母生姜防風

○集成肥兒丸 治小兒脾胃虛弱飲食不消飢肉瘦削
參朮苓甘半夏陳皮
蓮肉砂仁山查川連麥
神曲雞炒為丸蜜丸米
湯送下

○溫胃飲 治中寒嘔吐吞
酸泄瀉不思飲食
參朮扁豆陳皮炮姜
當歸炙甘

治氣脹氣脹用卜子
一兩研細末水調搗汁
以砂仁一兩用卜子汁浸一
宿炒乾又浸共七次每
服一下米飲下

治氣脹水脹用雞肫
蘿扎末一斤炒豆炙

有声有痰　半夏白芷五味防風
寒喘痰急　麻黃杏仁
熱喘欬嗽　桑白皮黃芩訶子
水飲濕喘　白凡皂莢葶藶
虛喘燥喘　阿膠五味子麥冬
氣短虛喘　人參黃芪五味子
諸瘧寒熱　柴胡為君
脾胃困倦　參芪白朮

疝氣者寒邪結聚而成內則臍腹絞痛外則
卵丸腫大專屬肝經

柴苓湯 治少陽膽經有邪而病疝
要見柴胡黃芩半夏白朮雲苓豬苓澤瀉桂心甘姜

加味二陳湯 治性急多哭卵腫痛連小腹謂之氣疝
一陳皮半夏茯苓小茴香川芎桂心吳甘生姜

木香內消丸 治症如前
木香三稜莪朮宣澤瀉川楝陳皮青皮鹽湯下

加味當歸散 治受濕氣小腹絞痛外腎作腫腹痛
當歸吳茱萸杜仲川芎炮姜木香小茴香炙甘

茱萸內消丸 治寒濕下墜囊腫作痛癲疝偏墜
吳茱萸大茴香桂青皮元胡柴青皮橘仁桃仁
白蒺藜木香鹽湯下

守病丸 治濕氣成胃
蒼朮南星白芷香附川芎橘核半夏神曲吳茱
萸小茴湯下

炙生虫毒研細末以石
榔湯三升漱汁無服
一盞同木香檳榔末
為丸下洗中肉虫毒服
香一錢二三分止
治胃寒心腹脹用厚
朴溫中湯 厚朴 廣
皮 炮姜 雲苓 草蔻
南木香 甘草 西
西寒不加附子桂
臟寒生脹満宜以辛
熱之藥運之
肝虛用窄多宜溫補脾胃

不思飲食　木香藿香

脾胃有濕　蒼朴赤茯白朮蒼术茯苓猪苓半夏防風

蒼朮木香湯 久病不食
蒼朮 黃柏 防己 川芎 木通 小茴香 川楝子
皮 猪苓 澤瀉 木香

男婦一切疝氣發腹痛用荔枝核四十九个炒焦黃
陳皮九个生硫黃四分共為末姜水打麪糊丸如豆大過痛
時空心酒送九丸 久病每日一服不過三服全好

上焦濕熱　黃芩瀉肺火

中焦濕熱　黃連瀉心火

下焦濕熱　酒洗黃蘗知母防已

下焦濕腫　酒洗漢防已龍胆草為君甘草黃蘗為佐

腹中脹満　須用姜製厚朴木香

腹中窄狹　須用蒼术

蓄血证 小便自利大便色黑
㾦黄证 小便不利
溺澁证 大便如常

腹中实热 須用大黄芒硝

過傷飲食热物 大黄為君 冷物巴豆為丸

宿食不消 須用黄連枳实

胸中煩热 須用巵子仁茯苓

胸中痞塞 实用厚朴枳实 虚用芍药陈皮 痰、
热用黄連半夏 寒用附子干姜

六欝痞满 香附撫芎 湿加苍术 虚用芍药 痰加陈皮 热加巵子 食加神
曲 血加桃仁

诸气刺痛 枳壳香附加引經药

诸血刺痛 須加当归 詳上下用根梢

凡痢疾皆由於暑濕或挾食傷於氣則病白傷於血則病紅氣血俱傷赤白並下治宜調氣和血木香黄連枳殼厚朴當歸茯苓白芍炙甘立茯補中益氣再處後以先也去黑姜棟木香沒之奇湯加荊芥穗加果

腸痛寒起 須用柴胡

胃脘寒痛 須加草豆蔻吳茱萸

少腹疝痛 須加青皮川楝子

臍腹疼痛 須用熟地烏药

諸痢腹痛 下後白芍甘草為君當歸白术佐之先痢後便黄蘗為君地榆佐之先便後痢黄芩為君當歸佐之裡急硝黄下之後重加霍香木香檳榔和之腹痛用白芍惡寒加桂惡熱加黄芩不痛芍藥減半

水瀉不止 白术茯苓為君芍藥甘草佐之谷不化加防風

小便黄澀 須用黄蘗澤瀉

產後呃逆不食
用生化加姜藿香砂仁
凡呃逆係胃氣
上冲者胃寒有氣
虛不能停胸宜溫
胃補中和胃
產後敗血入於脾
胃不能腐化穀胃
運化脾虛健脾
補中健脾
脾六君加……

小便不利　黃蘗知母當歸茯苓澤瀉為使

心煩口渴　須用干姜茯苓花粉烏梅棗半夏當歸

小便淋瀝　須用黃蘗杜仲

莖中刺痛　須用生甘草梢

肌熱有痰　須用黃芩

虛熱有汗　須用黃芪地骨皮知母

虛熱無汗　須用牡丹皮地骨皮

潮熱有時　黃芩午加黃連未加石羔申加柴胡
酉加升麻戌加羌活亥加當歸

風湿傷於脚似
四肢浮腫
奪命接骨灵丹
猩尾红花桃仁黄麻
根各三钱烧灰射香
土鳖虫去頭足大黄
自然铜煅古銖煅
乳香没药見差
血竭樟号補当尾活血
硃砂坐共為末入
瓶併收貯服者口
湿處有此氣者用
首一手五厘酒送下
中[illegible]部數次愈

自汗盗汗　須用黄芪麻黄根

驚悸恍惚　須用茯神

一切氣痛　调胃香附木香破滞氣青皮枳壳泄氣牽牛蘿卜子助氣木香霍香補氣人参黄芪冷氣草豆蔻丁香

一切血痛　活血補血当归阿膠川芎甘草凉血生地破血桃仁红花蘇木茜根玄胡索郁李仁止血发灰棕炭

上部見血　須用防風牡丹皮甘草大麦门冬為使

中部見血　須用黄連芍藥為使

下部見血　須用地榆為使

新血红色　須用生地梔子

接骨丹六方 接骨膏
將雞去肉用全身骨
以酥油炙脆為末每
服三分酒送下其用骨
三分取熱雞血調敷
患處用雞皮鄉傅
一周時即去
接骨膏
麝香一分 胡椒一分 百草霜
一兩虎骨五 射香五下
內加 地鱉虫共研為末
糯米煮粥同攤患
趁熱速敷
生肌散
象皮 龍骨 血竭 天靈蓋

陳血痲危
諸瘡痛甚
上身有瘡
下部痔漏
婦人胎前

須用熟地黄
苦寒為君黄芩黄連佐以甘草詳上下用枳梢及引經藥上三經
皆用連翹知母生地黄酒炒為用參芪甘草當歸瀉心火助元氣止痛
解結用連翹當歸藁本活血去血用蘇木紅花牡丹皮脈沉病在
裡宜加大黄利之脈浮在表宜行經黄芩連當歸人參木香檳榔
黄蘗澤瀉自腰以上至頭者加枳殼引之瘡所加鼠粘子出毒消
腫加肉桂入心引血歸膿堅不潰者加王瓜根黄藥子三稜莪述
昆布
須用黄芩防風羌活桔梗上截黄連下身黄蘗知母防風用
酒水各半煎引藥入瘡用皂角刺
蒼朮防風為君甘草芍藥佐之詳證加減
有痛以黄芩白朮安胎然後用治病藥發熱及肌熱者芩連參
芪腹痛者白芍甘草

文蛤焙荔枝核煅存性
共為末敖三文忩
地龍散筋骨痛
地龍桑寄生乳香沒
首牛膝红花木香归尾
羌活共為末空心起服
一本酒送下
跌打損傷神効方
血竭三錢地龍五錢沒葯
自然銅五錢生三七三錢地
鱉虫五分炙韭菜根
三錢炙共為末酒送下効
胃氣痛方
沉香丁香雄黃玄胡索
各等分不見火為末白卷
蔣珠砂為衣如桐子大
服一粒痛时酒送下
小茂

產後諸病 君柴胡黃連芍藥當帰半夏加白茯苓喘嗽去人參腹脹去
甘草血痛加川芎归桃仁
小兒驚搐 与破傷風同
心熱 摇頭咬牙黃連甘草桑赤丹
肺熱 右腮红瀉白散
腎熱 頦上红知母黃蘗甘草
虛煩頭痛復熱加枸杞萎蕤 虛而欲吐加人參
虛而不安 加人參
加地黃牡蠣地膚子 虛而多夢紛纭加龍骨
虛而多熱 加甘草 虛而冷加川芎帰芪藭干姜

班痧方

凡人受病急死即死名為班痧用銀針急刺舌下青筋出血即活但舌下二筋須識男左女右均刺中筋刺久出血不止

烏痧方

急以手蘸溫水香油在膝腕手腕拍打見有紫黑色用銀針刺出血急

絞腸痧

急用透明凡二字開水半碗涼水半碗將凡化開服之忌熱物飲食又以臘燭油為丸如桐

痘而損加鐘乳棘刺從蓉巴戟天

痘而多忘加茯神遠志

痘而吸〃加胡麻覆盆子柏子仁

痘而驚悸不安龍齒沙參紫石英小草若冷則用紫石英若發熱即用沙參龍齒不冷不熱時用之

痘而身強腰中不利加磁石杜仲

痘而勞小便赤加黃芩

痘而冷加麗(?)西黃芪

痘而小腸利加桑螵蛸龍骨雞膍胵

痘而大熱加黃芩天門冬

痘而口乾加麥冬知母

痘而多氣喘(?)欬嗽加五味子大棗〃

痘而多冷加桂心吳茱萸附子烏頭

痘而客熱加地骨皮白朮黃芪泉(?)地名(?)

痘而痰涎有痰〃氣加生姜半夏枳實

痘而小腸不利加茯苓澤瀉

手大每服七丸開水送下
即愈如不足復服病
即住

癲狗咬
雄黄 黑牽牛 大黄 滑
石各三五 班毛七个 射香
三厘為末本酒送湯服
忌葱韮麵食發物
又忌鑼聲

咽喉吹藥口瘡亦用
硼砂薄荷各三分冰片
五厘青黛一分人中白
三分荔子核一分為末吹
咽喉腫痛用金櫃蘭
取水服即愈

虚而損溺白加厚朴
肺氣不足加天冬麥冬五味子
肝氣不足加天麻川芎藭
腎氣不足加熟地黄遠志丹皮
神昏不足加硃砂預知子茯神

髓竭不足加生地當歸
心氣不足加上党参茯神菖蒲
脾氣不足加白朮白芍益智
胆氣不足加細辛酸枣仁地榆

四時用藥例

李時珍曰必先歲氣毋伐天和故春月宜加辛溫之藥薄荷荆芥之類以順春升之氣夏月宜加辛熱之藥香薷生姜之類以順夏浮

之氣長夏宜加甘苦辛温之藥人参白术蒼术黄檗之類以順

化成之氣秋月宜加酸温之藥芍藥烏梅之類以順秋降之氣

冬月宜加苦寒之藥黄芩知母之類以順冬沉之氣　王好古曰

四时揔以芍藥為脾劑蒼术為胃劑柴胡為时劑土臟皆

取决於少陽為發生之始故也

閉脱二証
中風中痰氣厥暑厥及
卒然倒仆昏暈不省牙關緊
閉兩手握拳謂之閉証有
餘之證宜疎風化痰如見
手撒眼閉遺尿鼾声肺
絶皆元氣竭絶之虚脱急進
参附湯可救十中救一用人参
多則五七錢少則三二錢加大
炒米煨姜仁棗接之補之
或当歸補血湯加炒米煨
姜仁棗

五臟五味補瀉

肝苦急急食甘以緩之甘草以酸瀉之赤芍　實則瀉子甘草　欲散急食

辛以散之川芎以辛補之細辛　虚則補母地黄黄檗

脾氣虛宜宜四
君子加芍藥木香
〡〡氣陽虛宜十全加姜桂
血虛宜四物加參朮
作嘔胃氣虛寒宜六
君加炮姜
自汗盜汗宜[illegible]加
五味子
食少体倦脾氣虛寒
宜補中益氣加苓夏
喘促咳嗽脾肺虛宜補
中益氣加五味麦冬
欲嘔食少脾胃虛宜人
參理中
腹痛泄瀉脾胃虛寒宜
附子理中

心苦緩急食酸以收之五味子以甘瀉之甘草 參芪 實則瀉子甘草
欲軟急食鹹以軟之芒硝以鹹補之澤瀉 虛則補母生姜
脾苦濕急食苦以燥之白朮以苦瀉之黃連 實則瀉子桑白皮 欲緩
急食甘以緩之炙甘草以甘補之人參 虛則補母炒姜
肺苦氣逆急食苦以泄之訶子以辛瀉之桑白皮 實則瀉子澤瀉 欲收急
食酸以收之白芍以酸補之五味子 虛則補母五味子
腎苦燥急食辛以潤之黃蘗知母以鹹瀉之澤瀉 實則瀉子芍藥
欲堅急食苦以堅之知母以苦補之黃蘗 虛則補母五味子

小腹痛亦經脬脾腎
虚宜十全加山藥山萸
泄瀉出冷脾腎虚參
加附子
熱渴淋秘腎虚降火宜
宜加減八味丸
渴淋秘肺腎虚宜
補中益氣減八味丸
外科不仍眼不痛後
渴氣虚宜四君加归芪桂

六腑六臟用藥氣味補瀉

肝胆温補涼瀉 辛補酸瀉 心小腸熱補寒瀉 鹹補甘瀉

肺大腸涼補温瀉 酸補辛瀉 腎膀胱寒補熱瀉 苦補鹹瀉

脾胃温熱補寒涼瀉 甘補温瀉 三焦命門同心

百病主治

諸風 有中臟中腑中經中氣痰厥痛風破傷風麻痺

吹鼻 皂莢末 細辛末 半夏末 熏鼻 巴豆烟 蓖麻烟 黄芪湯

擦牙 白梅肉 南星末 蘇合丸 吐痰 藜芦 皂莢末 食鹽 瓜蒂 萊服子

貼喎 南星末 雞冠血 鮮魚血
皂莢末 炒石灰

風寒風濕 羌活 防風 蒼朮 下 石菖蒲

發散 麻黃 荊芥 薄荷 葛根 白芷 升麻
生姜 葱白

風熱濕熱 甘草 黃芩 黃連 菊花 秦艽 桔梗

痰氣 天南星 半夏 前胡 旋覆花
藿香 蘇子 元胡索

痓風 即痓病 屬太陽督脈二經 其症發熱口噤如癇 身体強直角弓反
張 其對搐搦 傷風有汗為柔痓 傷寒無汗為剛痓

風熱濕熱 黃連 杏仁 竹瀝 羚羊角 牛黃
髮灰

風寒風濕 麻黃 桂枝 皂角 羌活
荊芥 防風 天南星

風濕 防風 荊芥 羌活 白芷

癲癇 有風熱 驚邪 皆兼虛與痰

風熱驚痰 羌活 防風 荊芥 薄荷 升麻 大黃
半夏 鬱金 竹瀝

吐咲 瓜蒂 皂莢 藜蘆

風痰　人參 石菖蒲 遠志 天麻
當歸 香附

卒厥　有尸厥 氣厥 火厥 痰厥 血厥 中惡 魘死 驚死

外治　半夏 菖蒲 皂角 韭汁 安息香
雞冠血 牛黃

內治　女青 菖蒲汁 南星 木香 附子
血厥 白薇 犀角 豬心血

傷寒熱病　寒乃標 熱乃本 春為溫 夏為熱 秋為瘧 冬為寒 四時為疫

發表　麻黃 羌活 葛根 升麻 白芷
細辛 蒼朮 荊芥 蘇葉

攻裡　大黃 栝樓實 甘遂 葶藶 大戟 芫花 芒硝

和解　柴胡 半夏 黃芩 芍藥
貝母 甘草 白薇 人中黃

溫經　人參 附子 黑大豆 干姜 吳茱萸

食復勞復　麥冬 胡黃連 苦枳 橘皮
枳殼 梔子 鱉甲

瘟疫　瘟疫論以脈中部洪大者為瘟疫用達原飲 芍藥 草 黃芩 知母
檳榔 厚朴 肉果仁 加姜棗 外不解加大黃

四君子湯中和義、参朮茯苓甘草比、益以夏陳名六君、祛痰補氣陽虛餌、除却半夏名異功、或加香砂胃寒使、

補中益氣芪朮陳、升柴参草當歸身、虛勞内傷功独擅、亦治陽虛外感因、木香蒼朮易歸朮、調中益氣暢神脾、

越鞠丸治六般鬱、氣血痰火濕食因、芎蒼香附兼梔曲、氣暢鬱舒痞悶伸、又六鬱湯蒼芎附、甘苓橘半梔砂仁

蘇子降氣橘半歸、前胡桂朴草姜依、下虛上盛痰嗽喘、亦有加参實合機、

歸脾湯用朮参芪、歸草茯神遠志隨、酸棗木香龍眼肉、煎加姜棗益

心脾怔冲健忘皆可却，腸風崩漏總能醫。

理血

心血虛別臥而汗出
舌胎白清脈寒濕
宜二陳
舌胎黃燥如脈洪
實係心脾積熱宜
三黃解毒湯
舌胎燥係實火宜清涼藥

養心湯用草芪參，二茯芎歸柏子尋，夏曲遠志兼桂味，再加酸棗總寧心。

桃仁承氣五般奇，甘草硝黃併桂枝，熱結膀胱小腹脹，如狂蓄血最相宜。

犀角地黃芍藥丹，血升胃熱火邪干，斑黃陽毒皆堪治，或益柴芩總伐肝。

去寒

理中湯主理中鄉，甘草人參朮黑薑，嘔利腹痛陰寒盛，或加附子總扶陽。

四逆湯中薑附草，三陰厥逆太陽沉，或益薑葱參芍桔，通陽復脈力能任。

白通加尿豬膽汁，乾薑附子兼葱白，熱因寒用妙義深，陰盛格陽厥無脈。

益元艾附與乾薑，麥味知連參草將，薑棗葱煎入童便，內寒外熱名戴陽。

清暑益氣參草芪當归麦味青陈皮曲柏葛根苍白术升麻泽泻枣姜随

生脉麦味与人参保肺清心治暑淫气少汗多兼口渴病危脉绝急煎斟

五苓散治太阳府白术泽泻猪茯苓膀胱化气添官桂利便消暑渴烦清

黄連解毒汤四味黄柏黄芩栀子備躁狂大热呕不眠吐衄斑黄均可使

白虎汤用石膏煨知母甘草粳米陪亦有加入人参者燥烦热渴舌生胎

升阳散火葛升柴羌活防风参芍侪生炙二草加姜枣阳经火郁發之佳

凉膈硝黄栀子翘黄芩甘草薄荷饶竹叶蜜煎疗膈上中焦燥实服之清

清魂散用泽蘭葉人参甘草川芎協荆芥理血兼祛風産中昏暈神魂清

小肠胀

集成金粟丹専能疏风散寒化痰清火降气并治痰嗽上气喘急眼翻手搐為截搐之聖方

九制牛胆南星二两　明天麻一两姜汁炒　白附一两生炒净　全蝎炒去头足　明乳香去油二两　代赭石煅两　直殭蚕去丝炒　赤金佰五张　真麝香二分　梅花片二分

共为末蜜为丸皂角子大姑以金箔每用一丸姜汤化下

安胎宜趁
涼血為主

膠艾湯四物兒阿膠艾葉甘草金婦人良方單膠艾胎動血漏腹痛

膠艾四物加香附方名婦寶調經寺

當歸散婦人姙娠朮芍歸芎及子芩安胎飲艾葉養血宜常服產後胎前功效宗

清氣化痰星夏橘杏仁枳實栝蔞實芩苓薑汁為糊丸順氣火消痰自息

治中風痰迷

滌痰湯用半夏星甘草橘紅參茯苓竹茹菖蒲兼枳實痰迷舌強服之醒

清震湯治雷頭風升麻蒼朮兩般充荷葉一枚升胃氣邪從上散不傳中

普濟消毒芩連鼠玄參桔梗藍根侶升柴馬勃連翹陳殭蠶薄荷為

末咀或加人參及大黃大頭天行力能禦宗

治衄能用小子

痞满燥实四全

秘若下满须桂枝

芍藥

治麻黄根用大黄海

益一苑姜母附子盐

甲鱉炒

穿山甲柿仁枣一

一斤皮鸡一两煮熟

導赤生地与木通草梢竹葉四般攻口糜淋痛小腸火引热同归小便中

清胃散用升麻連芎歸生地牡丹全或益石羔平胃热口瘡吐衄及牙宣

大承氣湯用芒硝枳实大黄厚朴饒救陰瀉热功偏擅急下陽明有数條

小承氣湯朴实黄譫狂痞鞕上焦強益以羌活名三花中風閉实可消詳

調胃承氣硝黄草甘中燥实服之好

姜桂麻黄芍藥甘

細辛半夏姜五味

升麻葛根湯錢氏再加芍藥甘草是陽明發热与頭痛無汗惡寒均堪倚

大青龍湯桂麻黄杏草石羔姜枣藏

益氣聰明湯蔓荊升葛參芪黄柏并再加芍藥炙甘草耳聾目障服之清

小建中湯芍藥多桂姜甘草大枣和更加飴糖補中藏虛劳腹痛服之瘥

人参败毒茯苓草枳桔柴前羌独芎薄荷少许姜三片时行感冒有奇功

亦治久痢赤白

温脾参附与干姜甘草当归硝大黄寒热并行治寒积脐腹绞结痛非常

凡痢后重须加木香槟榔

小柴胡汤和解供半夏人参甘草从更用黄芩加姜枣少阳百病此为宗

胸中有热胃中有寒

黄连汤内用干姜半夏人参甘草藏更用桂枝兼大枣寒热平调呕痛忘

黄芩汤用甘芍并二阳合利枣加烹此方遂为治痢祖

治肝经血病

逍遥散用当归芍柴苓术草加姜薄散郁除蒸功最奇调经八味丹栀著

治吐泻积食腹痛治泻痢减

藿香正气大腹苏甘桔陈苓术朴俱夏曲白芷加姜枣感伤岚瘴并能驱

痛泻要方陈皮芍防风白术煎丸酌补土泻木理肝脾若作食伤医便错

表裡俱實

防風通聖大黃硝荊芥麻黃梔芍翹甘桔芎歸石膏滑石薄荷芩朮力偏饒表裡交攻陽熱盛外科瘍毒總能消

陽明協熱下痢

葛根黃芩黃連湯甘草四般治二陽解表清裡兼和胃喘汗自利保平康

專治腹痛脹滿

平胃散是蒼朮朴陳皮甘草四般藥除濕散滿驅瘴嵐調胃諸方從此擴

治脾寒

清脾飲用青朴柴芩夏甘草白朮偕只加草果薑棗煎服熱多陽瘧此方佳

保和神曲與山楂苓夏陳翹萊菔子曲糊為丸麥湯下亦可方中用麥芽

瀉肺火

瀉白散桑皮地骨皮甘草粳米四般宜參茯知芩皆可入肺火嗽喘此方施

瀉肝火 治驚 聖方

左金茱連六一丸肝經火鬱吐吞酸再加芍藥名戊己熱瀉熱痢服之安

瀉青丸用龍膽梔下行瀉火大黃資羌防升上芎歸潤火鬱肝經用此宜

加青黛一 兼風生搐莫遺於此

外科一切宜先疏散解毒

○龍胆瀉肝梔芩柴生地當歸澤瀉茯木通甘草車前合肝經濕熱方能排

縮脾飲用清暑氣砂仁草果烏梅紫蘇甘草葛根偏熱加柴瀉熱消溫脾胃

○大橘皮湯治濕熱五苓六一二方綴陳皮木香檳榔增能清水腫及瀉泄

○茵陳蒿湯治疸黃陰陽寒熱細推詳陽黃大黃梔子入陰黃附子干姜

炙甘草

肥兒丸蓮肉麦冬心砂仁白术土炒人参肉豆蔻炒陳皮半夏雲苓山楂炒蓮藕苡米仁神曲

神效保生無憂散婦人臨產先服一二劑自然易生或遇橫生倒養甚至連日不生當歸白芍川芎菟絲子炒艾葉川貝荊芥子厚朴荊芥枳殼羌活黃芪枳殼甘草姜

乳癰初起用蔓荊子炒為末酒服渣敷患處

集成三合保胎丸 凡屢墮胎者皆肝氣有餘肝血不足血虛生熱火爍子宮或縱慾不節以致墮胎

條芩清肝火而涼血 六兩酒炒三次，孕婦黑瘦者加一兩，性燥者二兩

胎衣不下腹中脹急用牛膝腐化緩則不救 牛膝川芎

白术扶中氣以健脾 十二兩以黃土研粹炒，枯黃氣虛者加二兩

蒲黃炒 丹皮 當歸一兩五錢 桂心四錢

當歸養血寧心 十二兩去頭尾酒洗曬

熟地滋陰補腎 十二兩用砂仁三兩老薑三兩同地黃先蒸兩晝夜再以好酒煮之烏青

開骨散 用當歸五錢 自敗龜板一個酥炙研 川芎三錢 婦人頭髮一握燒灰存性

續斷填損傷而堅胞繫 十二兩切片酒炒

杜仲益腰膝而暖子宮 十二兩鹽水炒以斷絲為度

血迷 血暈不省人事用花蕊石一斤 上色硫黃四兩為末用火煆每服

共為末蜜丸每早鹽湯送下三錢晚服三錢

一血暈症本由氣虛一時昏暈能血虛盛者亦或有之如果形氣脈氣俱有餘胸腹脹痛氣粗外症兩手握拳牙關緊閉此血逆也用黑神

脫衣散 生產臨盆難產經日不下并死胎胞衣不下俱用 全當歸五錢 川芎三錢 上肉桂二錢 淮牛膝三錢 淨車前一錢五分水煎

益服此死胎不下及胞衣不來再加芒硝 者氣虛加人參三五錢 更加附子二錢 如不下者或平胃散加芒硝

當歸補血湯 產時去血過多心內怔忡頭暈眼黑昏沉不醒 炙黃芪一兩 歸身五錢 加炒米一兩 生薑五片 大棗五枚

黑神散 產後血暈胸腹脹痛氣粗牙關緊閉兩手握拳血逆之症 上肉桂 歸身 杭芍 炮薑 生地 大黑豆炒五錢 水酒煎

產門不閉 血氣大虛 十全大補湯 若因胎大而擦傷產門者 蘄艾益母草煎湯洗之

三陰三陽脉訣 陽屬膀胱并胃胆 陰居脾腎更連肝 浮長弦細沉微緩 脉症先將表裡看

三陰三陽詩

發熱惡寒身体痛 太陽 目痛身熱鼻中乾 陽明 耳聾口苦咽乾燥 寒熱往來脇下堅 少陽

手足自溫時腹痛 利而不渴陰家寒 太陰 脉沉惡燥元悶腎 引飲咽乾津液難 少陰

厥陰之脉循陰器 筋急唇青四体痛 舌捲耳聾囊更縮 不進識者少安痊 厥陰

表裡詩

發熱惡寒身体痛 脉浮屬表要君知 若不惡寒反惡熱 汗多屬裡定無疑

傷寒

脉浮緊澀如斯豈是傷寒 澀無汗 忽肰有汗是傷風 其脉必定浮而緩

吐血衄血陽乘陰者血熱妄行陰乘陽者血不歸經 嘔血出於肝吐血出於胃衄血出於肺

韭汁止吐血和童便服清胃脘瘀血 荷葉止口鼻血 桃仁破血閉 萊服子止血 槐花治唾血

痰症　食積　肺氣　狐惑

痰症頭身俱不痛發熱增寒汗惡風寸口脈浮胸痞填咽喉難息氣來沖

柴胡黃芩半夏西黨參甘麥冬白朮姜棗　金沸草前胡茯苓半夏細辛甘草荊穗赤苓姜棗

食積惡寒而發熱汗逆頭痛氣口數左脈平和身不疼即此可知其端倪　治中湯即理中湯加青陳皮

五積散蒼朮厚朴陳皮甘草麻黃桂枝白芍西黨茯苓當歸半夏干姜枳殼白芷桔梗川芎　大柴胡亦可

肺氣症與傷寒似頭疼身熱大便秘肢節痛皆順逆喘咳屢弱此為實人有此病多在此氣失或後反疼痺約起息喘脹或腫小腹不仁或心悸呆体持筋骨即痙胸或肉急膝枯細寒中三陽患必冷暑中三陰起病起此患多因氣實但多不服藥至虛死脈多浮弦起於風症汗濡而弱者濕家理宜從洪而弱者其中來下還需當之因寒此症續命神功脾胃作最是補劑及淋洗

續命湯麻黃桂枝白芍甘草參朮芎附子防己黃芩防風姜棗杏仁中寒中去附子桂　風痺用越婢湯

石膏白朮附子麻黃甘草姜棗　肺脹不不救　大腹皮紫蘇干木瓜甘草木香羌活　溼槐用脾約丸大黃

檳榔厚朴白芍麻子仁杏仁

狐惑傷寒數咽干唇口生瘡蝕可怕上唇食臟下食肛蟲蝕喉法療君無價　桃仁杏仁槐子艾棗

雄黃青葙子苦參黃連桃仁　為末以艾汁和納入下部

蚘

飢而不食名蚘厥食即因却吐蚘此是胃元積冷理中四逆及烏梅

疫癘 脉濡而弱 陰弦而緊

四時疫癘令疵難老幼相傳總一般夏責於心冬責腎秋肺春肝 春用升麻葛根湯

夏用桂枝湯理中湯大黃葛根荊芥黃芩桔梗茯苓藁本蒼朮甘草 桂枝半夏甘草

秋金沸草 冬葳蕤湯升麻葛根湯四時通用敗毒散

溫瘧 尺寸俱盛

尺寸俱盛名為瘧先熱後寒相搏多寒必定脉弦遲多熱自然脉弦數 小柴胡白虎湯五苓散柴胡

痓病 剛痓無汗 柔痓有汗

元來痓病屬膀胱口噤如癇身反張此是傷風感寒濕故分兩証有柔剛 剛痓麻黃葛根湯 麻黃葛湯

大便秘大承氣湯 柔痓桂枝栝蔞葛根湯即桂枝湯加蔞葛根一兩

溫病

溫病須當夏至前因冬月中於寒頭痛發熱脉洪盛抵法調停勉安 升麻葛根湯解肌湯 小柴胡

熱病

夏月得病名熱病本與傷寒同一証惡寒身痛及頭痛發熱仍是脉洪盛

中暍 脉虛而弱

夏日自汗名中暍脉虛濡弱多煩渴面垢背寒身不疼外症大假同熱病 身熱而渴用人參白虎湯小便不利

五苓散煩燥小柴胡發熱不惡寒竹葉石膏湯

溫毒 陽洪數 陰實大

溫毒渾身似錦紋發斑癮疹癢頻頻或時咳逆心煩悶冬感於寒發在春 黃連橘皮湯 麻黃杏仁甘草

風温 厚朴 枳實 葛根 黄連 橘皮 或黑膏 生地 好豉 猪膏 雄黄 雄黄 忌生姜

風温為病方今傳喘息昏昏但欲眠身重脈浮常出汗更加譫語必識言 葳蕤湯 麻黄 杏仁 甘草 葛根 白薇 羌活 川芎 石膏 青木香 知母 葛根湯 麻黄 杏仁 甘草 防風 升麻 羌活 石膏 生姜 葳蕤 知母 黄芩 南星 木香

風湿 風湿相搏脈須浮頭汗出身重骨節疼痛難轉側 此名風湿是因由 麻黄 杏仁 薏苡仁 甘草湯 防己黄芪 白术 甘草

中湿 术附湯 白术 甘草 附子 生姜 杏仁湯 麻黄 桂枝 杏仁 芍藥 天冬

湿温 其脈沉緩為中湿 只緣風雨與濕氣 一身盡痛友身黄 大便反快小便澁 五苓散 防風黄芪湯 术附湯

咳嗽 女人湿氣素來傷暑氣重傷病名曰多汗 頭疼支節脛冷 湿温當辨脈陰陽 蒼术白术湯 蒼术白虎湯

咳逆 往来寒熱胃中隔氣病識知嗽在陽 三陽 陰 陰证嗽時頻下利四肢沉重更清涼 少陰 小青龍 麻黄 桂枝 芍藥 細辛 半夏 生姜 甘草 五味子 半夏 小柴胡 橘皮湯 人參 通草 陳皮 生姜 真武湯 白术 附子 茯苓 芍藥 生姜

噦附 咳逆因知胃有寒 此名惡氣 人參 橘皮 半夏 并姜附 不應依方灸乳边 橘皮半夏生姜湯 小青龍加附子 去附子 或黑膏 甘草 瀉心湯 人參 黄連 黄芩 生姜 半夏 甘草 大棗 羌活附子湯 羌活 附子 茴香 木香 生姜

身痛 小柴胡主陽家噦 或用陳皮竹茹 腹滿須看前後部 猪苓 承氣 吳茱萸 桔梗

脈緊而浮身体痛太陽經病不堪任 更兼中湿并風湿 若是陰家脈弗沉 口清便自可身疼痛 救表元未有桂枝 若逆不利多清穀 四逆須之不必疑 口身如被杖 名陰毒 須向陰中調理之 汗後有时加霍乱 渾身疼痛脈遲遲 太陽脈浮麻黄湯 尺脈遲血不足 黄芪建中湯 桂枝芍藥 桂枝 人參 茯苓湯

脈沉身痛四逆真武　下利清穀身疼　救表桂枝　救裡四逆　桂枝芍藥人參湯

咽痛

發斑唾血成陽毒　陰中咽中必有瘡　汗出陰陽俱緊澀　還言咽痛是亡陽　甘桔湯　豬膚湯
陽毒升麻湯　升麻犀角射干人參甘草　玄參升麻甘草　黃連犀角湯　黃連木香烏梅犀角
四順湯　理中湯加甘草一倍

筋惕肉瞤

大凡發汗過多則筋惕肉瞤　也要知動氣右邊須忌汗　若還發汗便難醫　防風白朮牡蠣湯　小建中
真武湯　茯苓桂枝白朮甘草

傷寒自汗九

九般汗自傷風始　風濕風溫胃不和　中暑亡陽并霍亂　陽明柔痓汗偏多　防風白朮牡蠣湯

口燥咽乾

病在陽明背惡寒　人參白虎療咽乾　柴胡湯主少陽證　若是法家下即安　少陰口燥咽乾急下之　柴胡黃芩去…

寒熱往來

往來寒熱陰陽搏　大小柴胡及桂姜　待熱心煩仍熱渴　無汗頭汗洽相當　柴胡姜桂湯
甘草牡蠣栝蔞根桂枝　桂枝麻黃各半湯　麻黃桂枝杏仁白芍甘草生姜大棗　越婢一湯　桂枝芍藥
甘草芍藥麻黃石膏生姜大棗　婦人血入血室小柴胡加生地梔子桃仁丹皮

發狂

煩燥狂言仍面赤　熱潮咽痛号重陽　便於陽毒陰中治　葶藶升麻及大黃　蓄血　桃仁承氣湯　桃仁甘
草硝黃及桂枝　陽毒升麻湯　升麻犀角射干人參甘草　梔子仁湯　梔子赤芍大青知母升麻黃芩石
並杏仁柴胡甘草豉　葶藶苦酒湯　葶藶苦酒生艾汁　小便利大便黑臍下痛抵當湯　水蛭虻蟲桃仁大黃
犀角地黃湯　犀角生地芍藥丹皮黃芩

喘

脈浮無汗更加喘宜与麻黄屬太陽而不惡寒知在胃汗多潮熱下何妨　太陽麻黄湯　表未解桂枝加厚朴杏仁

汗出而喘無大熱麻黄加杏仁防脉　潮熱不惡寒大便實承氣湯

汗後水停漱發喘青龍加杏去麻黄　二陽合病胸中滿而喘麻黄據古方　傷寒無大熱水結胸但頭汗出

者　大陷胸湯　傷寒厥心下悸宜先治水

渴

太陽病脈浮而渴汗出陽明利少陰痛傷寒中暑大人引飲五苓深　太陽表不解心下有水氣渴

者小青龍去半夏加栝蔞湯　煩渴者人參白虎　小便不利而渴五苓散　風溫汗出而渴者栝

蔞根湯　内有栝蔞根人參防風甘草乾葛

霍乱

四肢拘急仍兼厥發熱惡寒四逆湯吐利止而身体疼痛桂枝和解最為良

肺金一 杏 冬半 五二钱半 玄 陈二钱 桔三钱 甘二钱半 白半 茯苓三钱 粟壳一两 只壳五钱 青皮二钱 陈皮二钱 芍药二钱 木香四钱 山药五钱 黄柏四钱

川连 川木 白术三钱 泥(?)一 天麻三钱 升麻二钱 炙草三钱 炙芪四钱 当归三钱 厚朴二钱 肉桂五分 杜仲二钱

痔漏方 脏连丸四两 腐(?)蒸二两 猪胆一个 用胆汁为丸 每服二钱 白汤送下

手足十二經有氣
血多少之分詳畧
氣血只須記手經
大腸足經胃多氣
少血 有六經 三焦
胆腎心肝脾多
血少氣心胞絡
膀胱小腸肝所
異 從何氣多
者任其氣血要
者破其血

心脉洪大心家熱々頭腦昏疾氣血結脚板心内似火燒々心燥口煩渴不歇
心脉微小主心虛心中驚悸汗流隨煩腦昏沉多困倦梦覌常在水中間
肝脉洪大血不調背痛項強疼々左脇肺軟手瘦目紅赤々行跌倒々常怕跌
肝脉微小四支疲体冷身寒氣血枯頭暈眼々花双足軟々背間長有汗漫々
腎脉洪大主腰疼々背痛頭強小腹膨膀胱暑也小便赤咽扎口苦舌干津
腎脉微小下傷精耳内蟬鳴々鐘鼓声腦痛腰疲双足腫背間盜汗出々無停
肺脉洪大心頭煩々咳有風疾常壅盛胸痛背痛脚又瘦口乾氣急時々倍
肺脉微小肺虛々氣間々真及枯口又乾手寒腹内多虛須防々嗽時々背上寒

餘乳蓄信作脹
乳通之必致成癰
作麦芽三兩炒熟
水煎服立消
乳癰用蒲公英根擂爛
服之必消暑患處
又吹奶用猪牙皂去皮
燒灰為末酒服一半

脾脉洪大心脹膨飲食不思只好眠頸疼腦痛恒發食後傷風降氣損
脾脉微小兩肩悲悶悶憂憂唇口焦手足軟疲多氣急無情無意過了宵
命脉洪大心胸熱渴渴之症血氣傷四肢懶怠少精神食後傷風精氣别
命脉微小号平和腎氣虛衰恒惡多手足多寒寒脾胃冷口淡無味不調和

脉主病

浮為風傷凡為浮脉患止受風也然脉多並見若浮而浮緊感冒風寒（浮緊傷風）
浮而滑則傷於痰食（浮滑風痰）浮而弦風熱入於肝經浮而芤蓄血在於心腹寸
浮而散心氣虛煩悶浮而實胸腸脹滿尺浮而散大小便难芤為蓄血之症寸
芤則血在上為吐為衄悶芤則血在中為腸痔心痛尺芤則血在下為大小便

滑主痰飲
浮滑風痰
沉滑食痰
滑數痰大

滑為宿食

實為陰火盛

陽毒

或傷作發狂

為譫語

弦為木盛

弦遲多寒

弦大主虛

弦細拘急

往滑為氣血俱寒〻痰氣不勝于血也為嘔吐為痰逆為宿食為

左寸滑數心熱也滑而實大心驚左關滑則熱而盜汗頭目之痛也左尺滑

則小便而赤濁而莖中之痛也右寸滑痰飲嘔逆也右關宿食不化也右尺

滑臍冷腹鳴或時下痢也若婦人血氣〻經滯而月事不調也脈來和緩

即為有孕實大實為三焦氣閉之症則其病多冰痰寒脹滿在上則為嘔

為逆在中則脹而痛在下則為積為痢弦為氣血收斂之症左寸弦則

頭痛而心惕左關弦則脇痛而痃癖左尺弦則腹痛而少腹右寸弦則肺

而咳嗽右關弦則肝剋脾而腹滿

傷寒要訣

麻黄杏子石膏
豉葱白
桂枝杏子甘草〻姜
枣〻
柴胡芩参草〻姜〻枣〻
柴胡芩芍夏大黄
只实姜枣
小陷胸半夏杏茯苓
大陷胸大黄芒硝甘
遂末
小陷胸黄連半夏栝
蒌根
桔梗以上元

太陽則頭痛身熱脊強陽明則目痛鼻乾不眠少陽耳聾脇痛寒熱嘔而口為之苦太陰腹痛自利尺寸沉而津不到咽少陰舌乾口燥厥陰煩滿囊拳一二日可發表而散三四日宜和解而全五六日便實方可議下七八日不解又復再傳日傳二經病名兩感經傳六日應無一痊太陽無汗麻黄為最太陽有汗桂枝當先小柴胡為少陽之要領大柴胡行陽明之秘堅至於三陰則難拘定法或可温而或可下且如陽症下之早者乃為結胸陰症下之早者因成痞氣發狂為血畜於内又大便之極實發黄乃熱積於中並小便之不利微喘緣表之未解喘滿而不惡寒者當下而痊微煩為陽之相勝煩極而反發厥者乃陰之所致狐惑並緣失汗虫蝕臓及后肛蚘厥却緣多饑虫攻咽及攻胃渴乃煩多班為熱熾陽明内熱則為寒熱往來太陽中風因作剛柔二痓衄血雖為欲解動陰血為厥竭之真厥利雖序尋常反然不有陰中之忌厥有二端治非一類陰厥脈沉而細初緣利過陽厥脈滑而沉如因便秘治陽則芒硝大黄治陰則附子姜桂因知風温寒汗不休當用漢防己勇痞利不止宜

旋覆花参
代赭石草姜
夏枣
抵当汤水蛭
虻虫桃仁大黄
茵陈汤茵陈
大黄栀子
大承气大黄芒
硝朴实
调胃承气大黄芒
硝甘草
肺主烦肾主热
厥主寒
分少阴角黄连乌
梅本者
桃仁槐子艾叶李

那为体类併病归于一经邪不传为表解疾愈战汗而为之症阳胜阴为热迫身
凉咳逆者先活附子腹痛者桂枝大黄湿热相搏则为结聚劳食再复乃成内伤阴阳
背恶寒而唇口燥独为白虎为少阴身体痛乃用真武正强将茯苓黄芩先出头汗却用火迫
经至亡阳渴欲饮水又即吐者五苓散烧欲漱水水入不下者犀角汤次乃大青龙就是理风寒不
承气正纲潮热不得眠而烦燥甚难子入于黄连但有热而呕嘈频姜一切不节散吐伤寒中脘
痰涎三物桃花汤理小阴下利濡血厚朴半夏治腹胀为偏宜葱白麻黄理头痛为王戒
调温毒可用黑膏散赤斑者则紫雪吐血者须并黄连柏皮咽痛者通用猪肤甘桔三物
桃花汤难云蛔蜒散结胃寒实中在十枣汤固那治带治痞内痛连两胁加以大柴
经中八下泻者黄连解毒脉迟热多寒少血而者大黄芪建中汗之多道动悸而惕下之先时
懊憹在胃旋覆代赭理心痞而噫不息桂麻各半瘵身痒而汗不通劳复身热汤名
狐惑粪肠治瘡热前用白头翁疫疠者春夏秋冬各有法须用十全九症方合者
引住坐卧皆不定号为百合一宗常神多眠身犹灼热风温可用萎蕤不眠心瘟疟

雄黃散雄黃青葙
子苦參黃連桃仁艾
臟寒理中丸參朮干
姜甘草
渴白虎石膏知母
粳米
化斑湯人參石膏
知母粳米
寒熱往來葛根
湯加柴胡
瘟病小續命湯桂
附芎麻黃杏朮草
防風黃芩防己人參
陽厥大柴胡
陰厥四逆湯
陽邪成厥當歸
[illegible]桂枝[illegible]甘草

煩欲汗必須萎蕤手足攣搐當用牛蒡根咳嗽生痰宜用金沸草不可汗下、
有表數種動氣與風溫在表、脈浮虛不可下自一非一端動氣與陽浮在表溫症
不可汗傷霍亂多緣熱惱溫病發於春夏要須柴葛以解肌奔豚協逆寒邪多
用桂苓為可保蓄悶作寒作熱多似瘧不惡結便如自念臍痛引陰名臟結下利白
胎不可胃口燥咽乾雖少陰下不可便尚瞤筋惕發動氣汗以致之厥陽明與少陰
合病脈弦者名曰負傷寒與熱病將痊食多者號曰遺自汗有風溫濕溫及亡陽則
朮附可貼身痛有表症兼表症兼陰毒則四逆難遲脾約者大便難而小便數治當
大黃以虎嘔吐有寒有熱寒則當溫熱當以解疏往者虛有實實則可下虛不可
為陽毒在斑煩亂以大青犀角可回因為陰毒則唇青厥逆以正陽甘草散極須急發
厥時胃煩尤甚比臟氣厥而精神散大汗後身熱愈甚此陰陽交而魂魄離陽脈
見於陰經其生也可知陰脈見於陽經其死也可許亡衰不然終冤制之實外火降
則為和會見歡欣之兆

芍藥枳殼甘草
風湿汗溢防已
黃芪白朮草姜棗
葳蕤湯石膏麻黄
白薇羌活杏仁甘草
川芎青木香葛根
自利赤石脂禹
餘粮各一兩
咳逆羌活附子茴香
木香干姜炮
腹痛桂枝湯加大黄
陰症身痛藥各白
芍生姜附子白朮
發黄茵陳五苓散
茯苓猪苓白朮桂
澤瀉

犀角湯 生地 丹皮 白芍
另犀角屑
大青 升麻 黄芩 桂枝 白芍
甘草 細辛 干姜 半夏
五味子
煩燥 黄連湯 黄連
黄芩 白芍 阿膠 雞子黄
小薊 炒赤小豆末
三物桃花湯
赤石脂 干姜 糯米
黑膏 生地 豆豉 雄黄
麝香 豬膏
陸 當歸 升麻 寒水石 石羔
犀角 黄芩 朴硝 麝香
元參 沉香 木香 丁香 甘草
三服 草黄 金 朱砂
貝母 桔梗 巴豆
十棗湯 芫花 甘付

陰毒 正陽 甘草 干姜 附子 麝香 皂夾 青皮 生甘
陽毒 狂班 煩亂 大青 阿膠 草豉 梔子 黄芩 黄柏 犀角 生地 丹皮 元參 石羔 黄連 白芍
脾約 大黄 以芫 厚朴 白芍 麻仁 杏仁
嘔吐 寒 小橘皮 陳皮 生姜
煩 大橘皮 陳皮 甘草 生姜
奔豚 寒邪 桂枝 赤芍 干姜 甘草 加肉桂
柴葛解飢湯 柴胡 葛根 赤芍 甘草 黄芩 知母 貝母 生地 丹皮 煩加竹葉

黃連解毒湯
黃連黃芩白
黃梔子
建中湯桑皮桂枝
白芍甘草生姜大棗飴餳
真武湯
茯苓白芍附子
白朮生姜
懊憹肥梔香豉
身疼桂枝白芍甘
草麻黃杏仁棗
勞復韮菜枳豉
氣壅
腸澼膿血白頭翁黃蘗秦皮黃連
百合病百合七枚生地汁一盞
虛煩大橘皮湯陳皮甘草人參

心臟形

手足掌搐牛蒡根湯牛膏根十條麻黃牛膝天南星好
咳嗽生痰金沸草前胡桔實花半夏細辛荊芥赤茯苓
溫瘧茯苓白朮散茯苓干姜甘草白朮桂枝

補　棗仁　麦冬　遠志　山藥　當歸　天竺黃

瀉　貝母　玄胡索　黃連　木香

温　丁香　石菖蒲

凉　竹葉　牛黃　硃砂　連翹　犀角

引經　獨活　細辛

無言口多汗白虎湯
熱多而渴五苓散汗出而厥四逆湯下利拘筋理中去白朮



此症作瀉便黄溺赤五苓散加梔子倘久作瀉之不痛減併和氣血氣虚不陷用補中益氣 風濕作瀉其色青之 損用六君加防風柴胡白芍 溫瀉水谷不化
泄瀉用升陽除濕 柴胡升麻防風神曲澤瀉猪苓陳皮蒼木炙甘生姜 腸鳴加益智半夏 瀉不止用七味白木散
要覺白术茯苓木香藿香干葛炙甘 寒瀉用胡椒生姜淡豆豉 脾虚用炒山藥炒白术炒蓮肉炒扁豆砂仁米湯砂糖

肝臟形

肝氣燥急而脇痛或芽水泡 大瓜蔞取連皮搗爛 粉甘草 紅花

補	木瓜	阿膠	薏仁	棗仁	
瀉	青皮	芍藥	柴胡	青黛	
溫	木香	肉桂	吳茱萸		
涼	甘菊	車前	胡黄連	龍胆草	
引經	柴胡	川芎上行	青皮下行		

瘧疾
風瘧先熱後寒先宜桂枝
白虎湯 羌散不退小柴胡
和解加常山檳榔烏梅截
之不退補中益氣湯
寒瘧先寒後熱用養胃湯
若散桂枝麻黄陳皮川芎
香正藿香半夏紫蘇
子芩檳榔柴胡知母黄芩不止
平胃散加檳榔草果截
之不止六君加炮姜桂
暑瘧但熱不寒煩渴宜
解毒白虎加柴胡不
止者柴胡石羔知貝母常山檳榔截之不去補中益氣
濕瘧又名痰瘧身体腫痛嘔逆脹満用胃苓散四君加猪苓澤瀉藿香不退平胃散加茯苓檳榔常山截之不止参苓白术散
食瘧又名痰瘧由停食而發其症飢不欲食中満嘔逆宜去其食二陳四獸飲要覺半夏茯苓陳皮白术姜棗甘草烏梅不止二陳六君加青皮姜桂瘧痢



左脇痛柴胡陳皮川芎赤芍枳殼香附甘草作痛不止者加山梔炭芩
青皮麦芽山查白芍当歸尾紅花
桃仁 小腸下痛者 半夏
推氣散治右脇痛 枳殼薑黄桂心甘草桔梗陳皮生姜

養胃小柴胡加烏梅檳榔解表藥佛不已六君加桂枝

夜瘧陰邪在血分宜
升提麻黄桂枝湯
加地黄紅花不止四物
合小柴胡加升麻後以
四君加常山烏梅檳榔
截之

胃臟形

胃脘痛嘔而吐腸者不得安痛嘔腸者有念

補 白术 蓮子 芡實 陳皮 扁豆 黄芪 山藥 半夏 百合 蒼术

瀉 枳實 朴硝 大黄

溫 藿香 厚朴 益智 丁香 吳茱萸 草豆蔻 良姜 干姜 生姜 香附 木香 胡椒

涼 滑石 石膏 石斛 玄明粉 黄連 黄芩 天花粉 山梔 升麻 連翹 葛根 竹茹 知母

引經 升麻 白芷上行 葛根上行 石膏下行

柴胡白虎湯
寒熱柴胡黄芩半夏
煨石羔一兩知母貝母甘草生姜
粳米

紅丸子治食積寒熱痞脹
京三稜蓬莪朮青皮陳
皮胡椒干姜烏梅麥芽

平瘧養脾丸不問遠年近年陳瘧不拘不截誠瘧之主藥又治瘧之良能以四君白术茯苓炙甘
陳皮半夏蒼术厚朴柴胡青皮豬苓澤瀉桂枝黄芪川芎鱉甲木常山草果仁均炒熟一米糊
丸每服六本有瘧加三稜莪朮



噎膈
用雄雞一只餓久一日餵飽停一时宰取嗉子用黄泥包煨存性研末又加丁香木香沉香各三分共為末用黑棗六兮去皮核用前藥搗爛為丸每日服三丸又取生鵝热血乘热服下亦良

鼓脹
用三分重烏魚一个包黄泥煨熟去泥食魚忌咸物一百二十日

燗服血

用螃蟲瓦上焙干研末菜油调敷即愈

大腸腑形

補 牡蠣 肉豆蔻 訶黎勒 五倍子 龍骨 蓮子 粟殼

瀉 枳殼 桃仁 麻仁 芒硝 大黃 檳榔 石斛

溫 乾姜 肉桂 吳茱萸

凉 槐花 條芩

引經 葛根 白芷 升麻上行 石膏下行

小腸腑形

補 牡蠣 石斛

瀉 荔枝 葱白 紫蘇 木通

温 小茴香 大茴香 烏葯

凉 天花粉 黃芩

引經 藁本 羌活上行 黃柏下行

牙痛往驗
虫疼用玉女煎
大熟地石羔麦冬牛膝
不疼用清凉散火湯
三陽中風發剛柔二
痙 剛痙用陽青丸
柔痙用桂枝葛根湯
桂枝芍药乾葛甘姜枣
又方川芎防風湯
桂枝白芍防風川芎
炙甘姜枣不解用小
柴胡加防風和解之
柴補閉塞用瓜蔞末
桂枝湯及湯內加瓜蔞
剛痙麻黃羌活防風茯神枳殼麦冬黃芩赤芍柴胡烘石羔炙甘龍齒 柔痙汗出不止為亡陽用附子散桂心附子白术川芎独活枣 失血吐衄目翻上用芎
归四逆湯桂枝白芍川木通炙甘當归細辛枣 傷暑搐搦用却暑丹白术茯苓猪苓澤泻桂心黃芩川連不炒炙甘 瘧疾作搐用清脾飲柴胡青皮半夏
黃芩陳皮粟米厚朴炙甘草果常山茯苓姜



受傷二十死 膀胱腑形 急驚由於風熱脾 慢驚由於脾胃之虛

治決

上至天庭二太阳

血海氣口の名垂

前後二心并外腎

丹田腎胎最难言

肋稍捧 手难當治

番腸吐糞見閻王

氣出不休不下藥

眼红目定甚慌忙

耳後受傷多不治

卵入二丸及胸垂

正腰受傷笑不治

傷胎鱼口二至不治

補 橘核 菖蒲 龍骨 續斷 益智仁

瀉 芒硝 滑石 澤瀉 車前

温 茴香 烏葯

凉 生地 甘草梢 黄柏

引經 槀木 羌活行上 黄柏行下

腰脊剖碎不藥 顶门髓出到泉御 陰陽混祿难醫治 請君仔細用意 方有人救 二十危不人石

死到泉御

有者亦云痰謂之
吹肺氣傷也
有痰無聲謂之
嗽脾濕動也
清晨咳屬痰火
午前嗽屬胃火
午後嗽屬陰虛
黃昏嗽火浮於肺
五更嗽屬食積
大便溏者屬寒
宜六君加炮姜
理中加附子

脾臟形

肺熱痰腥而稠鼻乾
肺寒痰清多涕

久嗽脾虛人參五味子湯參朮茯苓甘草麥冬五味子生姜棗
痰血人參[illegible]湯冬花膏人參天冬麥冬款冬川貝桑白皮橘紅杏仁黃芩當歸五味子
肺寒參蘇飲 肺熱清寧飲 桑白皮 甜葶藶 生地 赤茯
苓車前子炙甘草生姜棗

補 人參 白朮 黃芪 蓮子 芡實 陳皮 扁豆 甘草 山藥 蒼朮
瀉 枳實 青皮 石膏
溫 丁香 藿香 胡椒 良姜 附子 官桂 吳茱萸
涼 滑石 玄明粉
引經 升麻 白芍



清肺飲 前胡 柴胡 桑白皮 枳殼 知母 川貝 薄荷 甘草 桔梗 阿膠 麥冬 荊芥 黃芩
肺燥 清燥救肺湯 鮮桑葉 炙草 煅石膏 黨參 胡麻 阿膠 麥冬 杏仁 枇杷葉 川貝 瓜蔞 生地
犀角 熟地
肺癰 吐膿血 桔梗 貝母 川貝 瓜蔞皮 陳 阿膠 薏苡仁 葶藶 生黃芪 鮮桑葉 玄參 嫩茅根

肺臟形

大驚辛惡由於心膽受傷宜收復神氣爲主宜秘旨安神丸

秘旨安神丸 党參棗仁茯神半夏當歸白芍橘仁五味子炙甘草

團參丸 党參當歸豬心

補 人參黃芪五味子山藥紫菀百部麥冬茯苓阿膠

瀉 防風葶藶桑白皮枳殼澤瀉蘇子

溫 干姜生姜款冬花木香白豆蔻

涼 沙參玄參麥冬貝母桔梗瓜蔞仁枯芩山梔人溺

引經 葱白升麻白芷

又用食鹽一兩生姜五錢搗碎同炒黑溫服以指探吐

霍者三症多因夫食傷寒濕陽乘邪在上焦則吐邪在下焦則瀉邪在中焦則上吐下瀉宜正藿香正氣散

先瀉後吐乃脾胃虛寒宜六君子湯不愈理中湯

乾霍者不外先吐後瀉者乃脾胃有熱宜和解五苓散加藿香

乾霍亂上不吐下不得瀉急用鹽湯探吐之或針刺十指甲邊令出血或刺腕手濕後用藿香正氣散



腎臟形

補　茯苓地黃龍骨虎骨牡蠣桑螵蛸枸杞山萸肉牛膝

瀉　澤瀉知母

溫　附子肉桂破故紙鹿茸沉香膃肭臍

凉　黃柏知母丹皮地骨皮

引經　獨活　肉桂

凡治疳症初起
宜集聖丸
為主久痛以肥
兒丸為主
集聖丸　五靈蘆薈　汁蓮
五靈脂炒　君仁砂炒
青皮陳皮炒　莪术
螺僵　具子炒　南木香　虎
白歸身炒　川芎炒洗秀
川連姜炒　乾蟾　蟾酥炙
砂仁滋炒　黃米用為糊
膽　米糊　丸每服二三
咬牙舒舌乃上瘡唇紅
面白乃虛　面青目生
膜泄瀉夾水虛肝　身面俱黃髮稀虛脾　瘡鼻下赤爛口中腥臭喘嗽虛肺　耳內生瘡齒縫臭爛髮成走馬疳虛腎　食積久而成
疳用瘡成果　吋落潮热　久泄不止　目虛成疳　虛瀉止

膽腑形

補 龍胆草 木通

瀉 青皮 柴胡

温 半夏 生姜 陳皮 川芎

凉 黄連 竹茹

引經 上行川芎 下皮青皮 本經柴胡

救苦丹治婦人鬱氣用黄柏一両生川烏一両蛇床子二両雲連五钱枯凡二両生梔子一両共研細末
糊為丸每丸重一錢五分

死絶脉歌

雀啄連来三五下。屋漏半日一點落。彈石更来尋即散。搭指散亂真解索。魚翔似有亦似無。蝦遊静中跳一躍。寄語醫家仔細看。六脉一見休下薬。

動止脉歌

一動一止兩日死。兩動一止四日絶。三動一止六日亡。四動一止八日事。五動一止只十日。十動一止一年去。春草生時即死期。二十一動二年住。清明節後始命亡。三十動止三年次。立秋節

後病則危。四十動止四年次。小麦一熟命即亡。

平脉無病歌

左手寸之心浮大而散右寸之肺浮濇而短肝在左関沉而弦長腎在左尺沉石而濇右関属脾脉象和緩右尺相火与心同斷

各脉主病歌

浮脉主表府病所居。有力為風。無力血虛。浮遲表冷。浮數風熱。浮緊風寒。浮緩風濕。浮虛傷暑。浮芤失血。浮洪虛火。浮微勞極。浮濡陰虛。浮散虛極。浮弦痰飲。浮滑痰熱。

沉脉主裏。為寒為積。有力痰食。無力氣鬱。沉遲虛寒。沉數熱伏。
沉緊冷痛。沉緩水畜。
沉牢痼冷。沉實熱極。沉弱陰虧。沉細虛濕。沉弦飲痛。沉滑食滞。
沉伏吐利。陰毒積聚。
遲脉主藏。陰冷相干。有力為痛。無力虛寒。
數脉主府。左関主狂。有力實熱。無力虛瘡。
滑司痰飲。右関主食。尺為畜血。寸必吐逆。
濇脉少血。亦主寒濕。反胃結腸。自汗可測。

弦脉主飲。木侮脾經。陽弦頭痛。陰弦腹疼。

長則氣治。短則氣痛。細則氣衰。大則病進。

浮長風痫。沉短痞塞。洪為陰傷。緊主寒痛。緩大風虛。緩細濕痹。

緩濇血傷。緩滑濕痰。

濇小陰虛。弱小陽竭。陽微惡寒。陰微發熱。陽動汗出。為痛為驚。

陰動則熱。崩中失血。虛寒相搏。其名為革。男子失精。女人漏血。

陽盛則促。肺癰熱毒。陰盛即結。疝瘕積鬱。代則氣衰。或泄濃血。

傷寒霍乱。跌打悶絶。瘡疽痛甚。女胎三月。

病脉順逆歌

中風之脉。却喜浮遲。堅大急疾。其凶可知。
傷寒熱病。脉喜浮洪。沉微濇小。証反必凶。汗後脉静。身涼則安。汗後脉緊躁。熱甚必難。陽証見陰。命必危殆。陰証見陽。雖困無害。
勞倦内傷。脾脉虚弱。汗出脉躁。死証可察。
瘧脉自弦。弦數者熱。弦遲者寒。代散則絶。
泄瀉下痢。沉小滑弱。寔大浮數。發熱則悪。

浮主表
沉主裏
遲主臟
數主腑

嘔吐反胃浮滑者昌。弦數緊濇結腸者亡。
霍乱之候脉代勿訝。厥逆遲微是則可嗟。
嗽脉多浮浮濡易治。沉伏而緊死期將至。
喘息抬肩浮滑是順。沉濇肢寒均為逆証。
火熱之証洪數為宜。微弱無神根本脫離。
骨蒸勞熱脉數為虛。熱而濇小必殞其軀。
勞極諸虛浮軟微弱。土敗雙弦火炎則數。
失血諸証脉必弦芤。緩小可喜數大堪憂。

小兒脉
浮而有力為風熱 無力陰虛
沉而有力痰食 無力氣滯
遲而有力為痛 無力虛寒
數而有力實熱 無力瘡瘍
浮遲外寒 有力實寒 沉遲內寒 無力虛寒
浮數表熱有力實熱 沉數裡熱無力虛熱

脉征宜忌禑
脉浮身熱汗之鬆 沉細身涼莫強攻
咳嗽正強浮節數 細沉腫脹定為凶
脉遲下痢方為吉 洪大傷宜瘡疹逢
腹痛不堪浮有力 浮洪吐衄損無功
診脉之要無論浮沉遲數但於有力無力中
有力為陽為實熱 無力為陰為虛為
寅玉武珍言之

畜血在中○牢大却宜○沉濇而微○速愈者希○
三消之脉○數大者生○細微短濇○應手堪驚○
小便淋閉○鼻色必黄○寔大可療○濇小知亡○
癲乃重陰○狂乃重陽○浮洪吉象○沉急凶殃○
癇宜虛緩○沉小急寔○或但弦急○必死不失○
心腹之痛○其類有九○細遲速愈○浮大延久○
疝屬肝病○脉必弦急○牢急者生○弱急者死○
黄疸濕熱○洪數偏宜○不妨浮大○微濇難醫○

脹滿之脉。浮大洪寔。細而沉微。岐黃無術。
五臟為積。六府為聚。寔強可生。沉細難愈。
中悪腹脹。緊細為生。浮大維何。邪氣已深。
鬼祟之脉。左右不齊。乍大乍小。乍數乍遲。
癰疽未潰。脉宜洪大。及其已潰。洪大始戒。
肺癰已成。寸數而寔。肺痿之形。數而無力。肺癰色白。脉宜短濇。
浮大相逢。氣損血失。腸癰寔熱。滑數可必。沉細無根。其死可測。
婦人有子。陰搏陽别。少陰動甚。其胎已結。滑疾不散。胎必三月。

診脉要法　少年脉伏弱老大怕浮洪男以氣為主女以血為宗

診脉要法

少年怕伏弱老大怕浮洪男以氣為主女以血為宗

七表脉屬陽

寸浮 頭痛傷風汗自流鼻不聞香大便閉更並壅塞在咽喉

関浮 眼花肝起痛於頭腹脹胃虛並發渴昏沉好睡目無休

尺浮 耳聾精濕屡便溲大腸结滞肺氣急女人得此不須憂

三部浮 氣促並寒咳不休肺臟感寒榮衛起生津補益治無憂

寸芤 積血胸中咳不休若是腸鳴須急治為緣蠱毒在心頭

関芤 壅起癰痍暗雙眸須知積青為脬害起則腸癰痛可憂

尺芤　与知在尺病源在膀胱有積凝膿血小便淋瀝痛不休

三部芤　大腸鳴瀉血痢流冷熱不調淋瀝病脉詳左右在心頭

寸滑　面赤心煩多嘔嘈大便閉結不便難出要頭痛風涎痰

関滑　肝熱泪多頭似札胃寒口臭大腸鳴飲食不納脾家之

尺滑　男子便多腰部之女人月信必經閉經水不調為結滞

三部滑　氣攻臟腑痛似刮更加寒熱小便難四肢困倦且詳察

寸寔　面上生瘡風氣疾女人胎動或因驚陰上生瘡咽閉塞

関寔　瘡痳中焦心氣疾或傷破食發風痰赤主頭痛真憂慽

尺寔　伏陽在內因傷食胃氣難起胃無蒸食少脾虛宜審的

三部寔　陽狂燥急兩眼赤大小便閉口焦枯鬼語發癲風氣遍

寸弦　胸中急痛不能言肺臟結時心緊逆更無驚恐氣相連

関弦　木臟氣虛發瘕疾肝乘虛脹胃口冷宜妨飲食不能言

尺弦　須知水注滿丹田臍下冷痛多盜汗腰間強硬痛相連

三部弦　瘋癆走注氣相逢手冷足痠痛無力女人風敗血流延

寸緊　遍身痛疼痛難忍胃氣上攻頭項疼直言對尽行須穩

関緊　肝氣上攻心中窟脇肋痛傷硬物來欲吐不吐宜詳審

尺緊　臍下痺痛常常隱隱耳聾聲虛髓精流陰囊痒痛最難忍

三部緊　伏陽在內須詳診發令神亂發顛狂解熱安魂言有準

寸洪　煩燥傷風熱在胸須當急治防傳種涼隔連翹藥有功

関洪　翻胃頭痛面赤風脾臟兩經俱受熱更防筋症貫于胸

尺洪　小便赤色定難通腳膝酸疼猶自可忽然番變便為凶

三部洪　陽症傷寒體似烘頭痛目乾陽必信應先發汗次宜通

八裏脈屬陰

寸微　氣上冲心煩熱時寒熱虛驚加讝語腸中信秘亦何疑

泄寫相方

熟地二錢 罌粟
花椒 遠志
心 杜仲 蒼朮 炒
牛[illegible]子 川貝
桔梗 [illegible] 雄黃
山甲 [illegible]
一錢 天麻 [illegible]
姜蚕 二錢 [illegible]
七分 桂心 姜
三片 加[illegible]
[illegible] 日服一劑
連服三四劑
[illegible]
閏一月

關微　尺微　三部微　寸沉　關沉　尺沉　三部沉　寸緩

氣連胃脇痛無時腸胃之間多壅滯都緣虛起致如此

大便冷热泄無時心煩脇脹吼而急肺膝頑麻或有之

小腸連胃冷虛留敗血漏崩或白帶面無顏色骨枯羸

脾痛嘔吐悶連心骨蒸寒热时欬吐痨嗽傳尸病已深

腹中痃癖氣未侵氣冷又多嗌短促只因腸内水停深

肺膝痠痛不可禁五臟俱虛腕冷厥小便淋濁頻淋淋

冷热不調腹脹心臟胸脘虛股脛冷下元倚憊客邪侵

頭筋拘急相連頂頭目昏沉痛有时舉頭自眩身体倦

熱極脉細濇
寒極反鼓指
用藥相反
厥禍最大
亦不可代及年遠
芩連知柏寒
姜桂椒萸附熱

関緩　氣急大腸虛嘔乱口臭体虛腹脹澎走注痛胸連背痒

尺緩　夜夢鬼交心恍乱冷熱症知腹有癥小便條瀝分明對

三部緩　背膂多攻邪氣乱耳鳴本是腎虛家宜用神丹常補煖

寸濇　必主虛寒在胸膈時常面痒似微風胃氣弱衰詳此脉

関濇　兩目昏花多翳里脾家虛冷食難消補益湯丸方脫厄

尺濇　臍下雷鳴身冷厥積淋多格下部虛兩脚連膂難持側

三部濇　仿風頭痛分明說女子有孕要安胎無血多應是敗血

寸遲　心中寒氣無時逆肺臟有風時面痒女人思慮亦如之

关遲　心慌多食不生肌肝臟感寒成痞塊下焦冷痛早求醫

尺遲　脚重身衰因多迷恍惚梦魂驚入水女人带下怕風吹

三部遲　腎虛精耗髓枯危女人敗血痛如刺更防有孕更愆期

寸伏　積氣在胸心逆促三焦冷熱不调和急用灵砂類与服

关伏　水氣傷胃并破腹胃中痃癖塞難消何用祈神并禳福

尺伏　小便溺澁如淋瀝都緣水穀不能消腰重氣鬱仍破腹

三部伏　夜来盗汗渾如浴四肢沉厥虛熱生傷寒此症為陰毒

寸濡　力微汗少氣多虛腹中若見如雷吼只為劳心太過时

關濡　骨背身疼面黄虛下血傷風常怯冷切須指下驗相如

尺濡　心中散乱胃中虛須知筋弱滑精怯要治關元病必除

三部濡　冷起成癆五臟虛下元只為多傷敗耳内蟬鳴病不除

寸弱　陽道虛羸精已涸頭疼虛起汗自流慎戒房幃宜早覺

關弱　双目昏花時閉目眼暈頭痛腹脹生偏体忽然潮熱作

尺弱　陰中冷痛肌如削要知陰冷是為虛四体痠疼宜妙藥

三部弱　客風吹面浮腫作少年得此死無疑老者逢之身安樂

長脈　若峯長竿峯有餘三關通度須遠居三焦積熱病歸臟微微發汗方痊除

*R601
I234
18502

1457390

bea2936

#425962168

48本

中国书店（收）

1

50.— 元